

ОВЦЕВОДСТВО В КОЛХОЗАХ

За последние годы сильно возросло потребление шерстяных тканей населением как городов, так и села.

Рост реальной заработной платы в городе и улучшение благосостояния трудящихся делают спрос на шерстяные изделия более возрастающим.

В то же время снабжение населения шерстяными тканями отстает от действительной потребности в них. В связи с этим возможности расширения нашей шерстяной промышленности исключительно велики и зависят исключительно от развития нашего овцеводства. В 1930 г. промышленность была удовлетворена шерстью внутренних заготовок — тонина 9,3 %, полугрубой на 14,5 % и грубой на 56,6 % плановой потребности в них.

Таким образом дальнейшее развитие шерстяной промышленности должно идти за счет расширения сырьевой базы, путем максимального развития товарного общественного, колхозного и совхозного овцеводства и преимущественно тонкорунного.

Число голов овец в колхозах

На 1 января 1931 г. из общего поголовья овец по данным Госплана СССР в 100 млн. голов, имели в социалистическом секторе около 5 млн. голов, из которых 510 тыс. в колхозах. Средний процент обобществления овец по Союзу был 5,1.

Если мы остановим свое внимание на Северо-Кавказском крае как основном районе тонкорунного овцеводства, то увидим, что колхозное овцеводство, имевшее незначительный вес до 1930 г., за этот год быстро росло, достигнув больших размеров. Из общего числа овец в 4 млн. 526,3 тыс. голов в колхозах сосредоточено 1 млн. 424 тыс., из которых обобществлено 762,4 тыс., или 53 %.

В восточных овцеводческих районах Сев. Кавказа процент обобществления овец в колхозах значительно выше, чем в других районах. Так например: в Дубовском районе — 78,6 %, Завetenском — 94,6 %, Зимовниковском — 72,4 %, Ремонтинском — 96,6 %, Пролетарском — 98,5 %, Гигантском — 82,9 %, Туркменском — 93,4 %, Азгирском — 98,7 %, Прикумском — 94,1 %, Моздокском — 90,7 %, Петровском — 71,1 %, Ставропольском — 66,7 %, Александровском — 65,0 %, Куртавском — 62,9 %, Ново-Мысском — 51,5 %, Владикавказском — 92,6 %, Ю. Покровском — 79,0 %, Армавирском — 38,3 %.

В настоящее время мы имеем значительное количество обобществленных овец различных пород и отродий, но главным образом грубошерстных.

Сейчас нашей задачей является возможно быстрее поднять продуктивность и товарность этих грубошерстных овец путем их метизации с мериносowymi баранами, обладающими способностью улучшать и преобразовывать скрещиваемые с ними породы.

Итоги метизации 1928 и 1929 гг

Метизация грубошерстных овец с мериносowymi уже проводилась Животноводсоюзом, начиная с 1928 г. Для метизации были использованы матки валахской, курдючной, простой — длиннохвостой, монгольской, тушинской, цыгайской и других пород. Мериносowymi бараны принадлежали к новокавказскому типу.

Итоги метизации 1928 и 1929 гг. таковы. В 1928 г. поставлено на метизацию 170 тыс. грубошерстных маток, из которых 60 % было поставлено в колхозах. По выборочному обследованию союзов с общим количеством маток — 113 614 голов результаты метизации следующие: отход маток за зиму — 7,4 %,

яловость — 10%, приплод метисных ягнят — 19,5% от числа маток и грубошерстных — 41,6%.

Отход мериносовых баранов — 14,6%.

В 1929 г. должно было быть поставлено на метизацию 375 тыс. маток с 15 тыс. мериносовых баранов. План метизации выполнен на 88,8%. Из указанного числа подлежащих метизации маток в колхозах было поставлено 70%.

Результаты метизации 1929 г. по состоянию на 1 июня 1930 г., судя по выборочному обследованию союзов с общим количеством маток — 156 740 голов и 5 490 мериносовых баранов, таковы: отход грубошерстных маток за зиму 10,2%, отход мериносовых баранов — 11,0%, отход ягнят с момента окота — 11,1%, яловость маток — 11,6%, приплод: метисных ягнят — 28,5% и грубошерстных — 37,2%.

Рассматривая итоги метизации видим, что ягнят-метисов получено чрезвычайно мало: в 1928 г. — 19,5% и в 1929 г. — 28,5%.

Такой результат работ по метизации более чем неудовлетворителен.

Причины плохих результатов метизации 1928 и 1929 гг.

Основными причинами плохих результатов работы по метизации явились: поздний отпуск кредитов, вследствие чего грубошерстные матки заготавливались и ставились на метизацию, сукотно-покрытые грубошерстными баранами; поздняя заготовка и доставка мериносовых баранов и невысокое качество их (63% всех заготовленных баранов были 1½-летними, т. е. не достигшими половой зрелости). Кроме того молодые бараны были просто плохо выращены и плохо выкормлены: слабое обслуживание зоотехнической и особенно ветеринарной помощью. Ветеринарная помощь настолько слаба, что мериносовые бараны гибли от чесотки в огромном количестве (Баширия — 44,8%, Дагестан, Баба-Юрт — 30%); слабый и неумелый уход за мериносовыми баранами на местах метизации и незнание населением с мерами предупреждения и лечения чесотки — главного бича тонкорунного овцеводства; и наконец низовой сетью недостаточно осознана необходимость расширения метисного овцеводства и поэтому неуделение должного внимания правильной постановке метизации.

В отдельных районах, в которых работа по метизации была поставлена правильно и были необходимые руководство и обслуживающие кадры, результаты метизации были иные, как

тизированных овец в племенных овчарнях Кизлярского, Караногайского и Ачикулакских районных союзов было получено 95,9% ягнят метисных и мериносовых ягнят по отношению к маткам, пошедшим в случку, смертность ягнят была — 7,1%.

Этот отличный результат — прямое следствие правильной постановки овцеводческих дел в овчарнях. Здесь прежде всего было обращено внимание на организацию ветеринарной помощи. Когда в 1929 г. появилась эпизоотия оспы и чесотки, к осени она была ликвидирована усилиями ветперсонала.

Низший обслуживающий персонал в овчарнях был тщательно подобран, и кроме того чабаны были заинтересованы в наибольшей продуктивности своего стада, так как за вышней процент живых ягнят во время окота они премировались.

Успех Дагестанских овчарен необходимо только закрепить, но и распространить его овцеводческие колхозы всего Союза.

Метизация в 1930 г.

В 1930 г. было поставлено на метизацию 680 тыс. маток и 26 тыс. мериносовых баранов, преимущественно новокавказского типа. Большинство баранов было своевременно поставлено в колхозы. Перед отгрузкой мериносовые бараны прошли двукратную купку противочесоточных ваннах.

План метизации на 1931 г. и необходимые мероприятия для ее успеха

В 1931 г. по плану Колхозцентра должно быть доставлено на метизацию 2,5 млн. маток. Для обеспечения этого количества маток производителями намечается заготовить чистую систему с.-х. кооперации 32 тыс. мериносовых баранов и получить у Овцеводтреста 51 тыс. мериносовых, цыгайских и метисов мериносовых баранов.

Широкие размеры метизации, огромное значение ее для промышленности и недостаточное знакомство колхозников с разведением тонкорунных овец, заставляют обратить особое внимание на организационную сторону этого мероприятия.

В частности необходимо:

- а) выделить районы сплошной метизации;
- б) метизацию проводить главным образом в укрупненных товарных стадах с поголовьем не менее тысячи маток;
- в) обслуживание мелких стад колхозников, находящихся в индивидуальном пользовании колхозников, проводить через укрупненные случные пункты, организованные при совхозах Овцеводтреста или



Мериносовые овцы Ново-Романовского колхоза „Красный буденевец“

ульных колхозах. Каждый намечаемый случай пункт должен состоять примерно из 300—500 меринсовых производителей, обеспечивающих покрытие не менее 10 тыс. маток. Радиус обслуживания указанных пунктов должен быть примерно 50—60 километров;

б) в целях наилучшего использования производителей колхозы должны проводить в метизируемых стадах исключительно ручную чужку;

в) максимальное внимание должно быть уделено организации ветеринарного обслуживания метизируемых стад и обеспечению их всеми необходимыми медикаментами, особенно метизовочесоточными;

г) колхозы не позже июля месяца должны выделить в отдельные отары грубошерстных маток, предназначенных для метизации, не допуская совместного выпаса их с грубошерстными баранами;

д) заготовку, качественный отбор тонкорунных и цыгайских баранов, переброску их в районы метизации и организацию случных пунктов закончить к началу сентября;

е) все заготовленные бараны перед отправкой должны пройти двухкратную чужку в метизовочесоточных вагонах. По прибытии на место назначения бараны снова должны пройти двухкратное противочесоточное лечение и поддержать карантин.

Меринсовое овцеводство

Из 1,3 млн. меринсовых овец, имеющих в СССР, обобществлено в колхозах 260 тыс.

голов и имеется в совхозах Овцеводтреста 650 тыс.; остальные находятся в индивидуальном пользовании колхозников и у прочего населения. К концу 1931 г. намечается обобществление всех меринсовых овец, находящихся в индивидуальном пользовании.

Меринсовое овцеводство сосредоточено главным образом на Сев. Кавказе, Дагестане и Калмыцкой области и принадлежит к новокавказскому и мазаевскому типам.

Улучшать колхозное тонкорунное овцеводство намечается типом рамбулье. В 1930 г. в колхозах размещено 200 баранов рамбулье, полученных от Овцеводтреста; в 1931 г. намечается получить 700 баранов того же типа для обобществленных тонкорунных стад Сев. Кавказа, Дагестана и Калмыцкой области. В настоящее время в колхозах должна проводиться главным образом массовая работа по улучшению стад. Производство высоко-классных животных, — чисто племенное дело, — должно быть сосредоточено в совхозах Овцеводтреста, где имеются технические силы и могут быть созданы надлежащие условия для выращивания высококлассных племенных овец.

В целях обеспечения достаточного количества производителей для метизации последующих лет колхозы в 1931 г. обязаны вырастить всех родившихся меринсовых баранчиков.

Для правильного выращивания племенного молодняка намечается организация в колхозах специальных укрупненных баз выращива-

ния, в которых молодняк будет выращиваться под наблюдением ветерсонала, получая надлежащий уход, кормление и содержание.

Цыгайское овцеводство

В настоящее время в колхозах обобществлено 250 тыс. цыгайских овец и их метисов.

Колхозцентром намечено расширение и улучшение цыгайского овцеводства главным образом в Крыму, в некоторых районах Сев. Кавказа (Сальский и др.), на Украине (Мелитопольский район), Средней Волге и в Туркменистане. В 1931 г. намечается вырастить до 10 тыс. цыгайских баранчиков для метизации грубошерстных овец главным образом на Средней Волге и в Туркменистане.

Каракулеводство

В колхозах обобществлено 166 тыс. голов каракульских и смушковых овец, из них в Узбекистане 57 тыс. голов.

Учитывая исключительные качества и высокую рентабельность каракулеводства и значение его продукции для экспорта, Колхозцентр поставил себе задачей максимально расширить мероприятия в этой отрасли.

Так в 1931 г. намечено произвести отбор — бонитировку по смушке и экстерьеру 35 тыс. баранчиков и 155 тыс. ярок и вырастить их в Средне-Азиатских республиках с тем, чтобы потом распределить по укрупненным товарным стадам для чистого разведения и метизации как в Средне-Азиатских республиках, так и на Украине, в Крыму, Дагестане и на Сев. Кавказе.

Грубошерстное овцеводство

Грубошерстные овцы составляют почти 97 % всего овечьего поголовья СССР.

Основная работа по грубошерстному овцеводству должна быть проведена в Казахстане и Киргизии, являющихся сырьевой базой для грубосуконной промышленности. Промышленность в 1930 г. от одного Казахстана должна была получить 32 % всей товарной шерсти Союза.

Размер стада в Казахстане на 1930 г. исчисляется в 19,7 млн. голов. Основная порода — курдючная. Исключительная выносливость курдючной овцы при хорошем качестве мяса и сала делает ее исключительно ценной породой, но при условии повышения качества и придания однородности ее шерсти.

Вопрос кормодобывания в Казахстане имеет громадное значение. Поэтому здесь необходимо

организовать сеть сеноуборочных станций сенофуражных и силосных баз для сохранения стада от периодически повторяющихся стихийных бедствий (гололедицы, джута).

Затем намечается расширение работы и овчинно-пшубному романовскому овцеводству в районах разведения короткохвостой северной овцы, а также проведение мероприятий по сохранению и стимулированию роста улучшенных отродий грубошерстных пород: валахской, кучугуровской, михновской, черкасской, тиссарской, тушинской и других, для чего намечены отбор и распределение по колхозам для выращивания 35 тыс. баранчиков. Кроме того намечается закупка 25 тыс. племенных производителей с последующим распределением между колхозами.

В общем производственный план работ в колхозном овцеводстве на 1931 г. сводится к следующему:

Имеющееся на 1 января 1931 г. обобществленное стадо овец и коз в колхозах в 5 млн. 100 тыс. голов к 1 января 1932 г. довести до 9 млн. голов. Для чего намечено в период 1/I — 1931 г. по 1/I — 1932 г. закупить 435 тыс. племенных овец и обобществить вновь свыше 3 млн. голов овец.

Годовая продукция мяса и шерсти

Взрослых овец намечено выбраковать 782,4 тыс. голов и молодняка — 1 млн. 277 тыс. голов, всего 2 млн. 059,7 тыс. голов с общим валовым выходом мяса 34 235 тонн. Из этого количества намечается ориентировочно товарный выход мяса в количестве 20 541 тонны.

Общий годовой валовой выход шерсти намечен в 14 923 тонны и товарный выход шерсти в 11 318 тонн.

Необходимо районирование овцеводства

Большие размеры намеченной по овцеводству работы делают совершенно необходимым районирование овцеводства.

Необходимо выделить определенные районы разведения овец с указанием отдельных пород и направлений и с учетом возможной перспективы их разведения. Особое внимание должно быть обращено на установление районов промышленного тонкорунного овцеводства и его метизации с грубошерстными породами, а также на районы каракулеводства, мясного и овчинно-пшубного овцеводства.

К. Шуминский