

нормальный, куда относятся животные с хорошим сложением и шерстью «голубой» окраски. Такая окраска получается от сочетания черной юсти и белого пуха, соотношение которых должно быть как 1:2, т. е. одна треть ости и две трети пуха. Овчинки с животных первого класса прочные, легкие и теплые. Из них шьют «романовские» полушубки. Во второй класс относятся животные более грубые, темной окраски, так как в них преобладает черная юсть. Овчинка тяжелая и менее теплая. В третий класс относятся более нежные животные, светлосерой окраски, так как черная юсть находится в небольшом количестве и значительно преобладает белый пух. Овчинка не так прочна, так как пух быстро сваливается.

При бонитировке метисных овец, полученных от скрещивания грубошерстных пород с тонкорунными, животные сортируются на 4 класса, так же как и мериносы. Объясняется это тем, что метисы бывают очень различны. В I класс

идут животные, приближающиеся к мериносу или прекосу. Шерсть должна быть тонкая, однородная, состоящая из юдного пуха, имеющая закрытое руно. Во II класс — животные, имеющие полугрубую шерсть, мягкую, но неуровненную, с присутствием небольшого количества более грубого волоса переходного или тонкой юсти на крестце и ляжках. В III класс — животные, имеющие шерсть в виде мелких косиц, с большим количеством пуха и незначительным — ости. В IV класс — животные, по типу и характеру шерсти приближающиеся к исходной грубошерстной породе.

Ставя задачи реконструкции овцеводства, увеличения и повышения качества продукции, каждый совхоз и колхоз должны проводить бонитировку овец. Без этой работы мы не осуществим необходимых темпов развития овцеводства для удовлетворения промышленности шерстяным сырьем и не разрешим мясную проблему.

Положенцева

ВОСПИТАНИЕ ЯГНЯТ

Вопрос выращивания и воспитания ягнят не имеет достаточного освещения в литературе. Вместе с тем он является чрезвычайно важным, так как от правильного воспитания ягнят зависит развитие овцеводства как в количественном так и в качественном отношениях.

К концу пятилетки овцеводческое поголовье должно быть доведено в совхозном секторе до 18 млн. и в колхозном до 35—40 млн. голов. Для осуществления этих задач необходимо быстрое увеличение прироста стада, т. е. увеличение количества приплода и сведение падежа ягнят до самых минимальных размеров. Это может быть достигнуто при хорошем уходе и кормлении ягнят и нормальных санитарно-гигиенических условиях их содержания. При отсутствии же таковых создается благоприятная почва для появления и

распространения всякого рода заразных и глистных болезней, которые чрезвычайно пагубно отражаются на овцеводстве, давая массовый отход не только ягнят но и взрослых животных. Кроме того правильное выращивание ягнят является залогом получения хороших, нормально развитых, здоровых животных, которые будут давать большую и лучшего качества продукцию шерсти, мяса, молока.

Хорошее кормление ягнят в молодом возрасте наиболее выгодно. Если взять мериносовых ягнят, то они скорее развиваются, увеличивают скороспелость настолько, что 1½-летние ярки могут смело идти в случку. Этим выигрывается целый год и сокращаются расходы на содержание. В возрасте двух лет такие ярки уже дадут приплод, а это является чрезвычайно важным обстоятельством, так как этим значительно

ускоряется темп развития овцеводства и увеличивается поголовье мериносовых овец в более короткий промежуток времени.

Так как выращивание ягнят, как ухаживать выше, является чрезвычайно важным делом в овцеводстве, широкому кругу работников низовки совхозов и колхозов необходимо знать хотя бы самое основное в этом вопросе.

Об уходе за суягной маткой и об окоте, которые имеют также весьма существенное значение, здесь мы останавливаться не будем, так как эти вопросы будут освещены в специальной статье.

Ягнята первое время пользуются исключительно молоком матери, почему должно быть обеспечено достаточное его количество. Это во многом зависит не только от молочности овцы, но и от состояния ее упитанности и условий кормления. На образование молока, содержащего 21,3% сухого вещества (8,94% жира, 5,06% сахара, 6,3% белка), требуются соответствующие питательные вещества. Поэтому подсосным маткам необходимо предоставлять лучшие пастбища и подкармливать их сильными кормами в размере 400—500 г в сутки на голову, преимущественно легкими: отрубями, овсом, льняной жмых. Если хозяйство имеет очень ограниченное количество кормов, то подкормка дается только племенным маткам и наиболее истощенным и слабым из общего пастбищного стада.

Если матка пала, оставив ягненка, или имеет двойню, которую не может сама воспитать из-за недостатка молока, пользуются следующими способами для воспитания ягнят.

1. При наличии в хозяйстве коз, последние используются в качестве «мамок» ягненка от павшей матки или одного из двоен подсаживают к козе, которая его и выкармливает.

2. Весьма рационально в южных и юго-восточных степных районах в овцеводческих хозяйствах держать смушково-молочных маток, например караульских. Плучаемых от них ягнят резать на смушки, а самих маток использовать в качестве мамок для воспитания мясо-шерстных ягнят.

3. Искусственно выпаивать молоком ягнят из бутылочек с резиновым соском. Но этот способ является менее рентабельным, так как требует содержания

стада коров для получения молока, которое по своему составу значительно отличается и уступает овечьему и козьему, и сопряжен с большей затратой рабочей силы, что увеличивает расходы по выращиванию ягнят. Развитие их при этом несколько отстает, и наблюдается больший ютход. Все это, вместе взятое, указывает на рациональность первых двух способов и требует более осторожного подхода к последнему.

Особенное внимание на ягнят должно быть обращено в течение первых двух месяцев, когда они еще недостаточно окрепли и легко подвергаются простудам и заболеваниям. Дальнейшее их развитие во многом зависит от условий воспитания в эти первые месяцы.

Начиная со второго месяца, мясо-шерстных ягнят (рамбулье, прекос, английских мясных) надо подкармливать. Для этого устраивают большую клетку с узким входом, через который могут пройти только ягнята, взрослая же овца проникнуть в нее не может. Клетка устраивается из переносных щитов и может быть поставлена как в овчарне, так и на пастбище. В ней устанавливают кормушки для подкормки.

Лучшей подкормкой является смесь, богатая белком, из давленого овса, пшеничных отрубей и мелко смолотого жмыха. Смесь задается из расчета 30—50 г в день на голову с увеличением через месяц до 100—200 г и доводится к концу четвертого месяца, т. е. к моменту отъема, до 400 г в сутки.

Ежедневно нужно очищать кормушки от остатков корма, так как загрязненные остатки могут вызывать у ягнят расстройство пищеварения. Для растущих ягнят весьма ценным кормом являются бобовые с большим содержанием белка, солей и витаминов, которые повышают интенсивность роста. Искусственные клеверные и люцерновые пастбища в этом отношении дают прекрасный результат. Кроме того один гектар люцернового пастбища может прокормить в 10—15 раз большее количество животных.

Всем ягнятам обязательно нужно давать поваренную соль, усиливающую обмен веществ, и при недостатке кальциевых солей в корме — костяную муку или мел, содержащие кальций, необходимый для формирования и роста костяка.

Подкормку лучше производить утром. К искусственным бобовым пастбищам ну-

жно приучать ягнят постепенно. Начать с полчаса и затем увеличивать время пребывания на люцерне. Перед выгоном на люцерну, клевер или вику необходимо сначала дать подкормку и пасти на скудных естественных пастбищах. В противном случае от тучного корма легко получается вздутие брюха, которое нередко кончается смертью. Поэтому надо следить за животными и быть осторожным.

При хорошем кормлении ягнята дают не менее 200 г привеса, а скороспелые мясные породы до 300—400 г в сутки. Нормальный вес при отъеме у мясошерстных ягнят должен быть 30—35 кг.

После отъема ягням предоставляются лучшие пастбища, и продолжается их подкормка. Кроме подкормки концентрированным кормом необходимо давать сочные корма-корнеплоды или силос в размере 0,5—1 кг в день.

Для нормального роста и развития ягнят необходимо нормированное кормление, причем всегда надо иметь в виду,

что хорошее кормление в молодости дает наилучший экономический эффект.

Хорошее кормление экономически себя оправдывает, тогда как плохое, на первый взгляд кажущееся наиболее дешевым, в конечном счете является убыточным.

При отъеме ягнята разбиваются по полу и содержанию отдельно (баранчики и ягнички). Норма подкормки баранчикам устанавливается несколько выше, чем для ягничек, примерно на 100 г.

Рациональное кормление ягнят по норме дает более высокую оплату корма, т. е. когда на единицу корма получается большая продукция, больший привес, настриг шерсти и др. Наибольший рост и наибольший привес дают ягнята в первый год жизни.

При хорошем уходе и содержании молодняка в результате получают высококачественные во всех отношениях животные.

Т. П.

ЯГНЕНИЕ ОВЕЦ И ВОСПИТАНИЕ ЯГНЯТ В КОЛХОЗАХ

В настоящее время по Союзу ССР производится колоссальных размеров работа по метизации грубошерстных маток с мериносовыми баранами.

Одним из основных моментов, решающих дело метизации, является ягнение. Чем больше будет получено в хозяйстве ягнят, тем больше будет товарность хозяйства, тем больше будет получено на единицу затраченного труда, а следовательно и больше будет дохода от овцеводства.

Каждое хозяйство должно поставить себе целью, чтобы овцы ко времени окота были с хорошей упитанностью тела. Если матка будет худа, то это может отразиться не только на ней, но и на дальнейшем воспитании ягненка: у овцы может быть очень мало молока; ягненок будет голодать, в результате чего — слабое развитие ягненка и даже падеж. Поэтому перед окотом необходимо овец пересмотреть и всех худых выделить в особую

группу, которую подкармливать концентратами.

Для обеспечения нормального ягнения еще до начала окота в овчарне необходимо приготовить: кучки (клетки) для маток с ягнятами из расчета 50 шт. на 1 000 маток размером 1 кв. м; переносные решетки для отделения различных групп овец; колья для прикрепления решеток; фонари «летучая мышь»; матковозки для подвозки в овчарню овец с ягнятами и обратно — обьягншихся на пастбище; вилы, лопаты и прочий инвентарь, необходимый для уборки овчарни, а также хорошее сено и концентрированные корма (жмых, отруби).

В последние месяцы беременности и особенно в последние дни необходим особо внимательный уход за овцами. Нужно устранить все условия, которые могут вызвать выкидыш, в частности ни в коем случае не давать заплеоневого корма; следить, чтобы при прогоне через