

жно приучать ягнят постепенно. Начать с полчаса и затем увеличивать время пребывания на люцерне. Перед выгоном на люцерну, клевер или вику необходимо сначала дать подкормку и пасти на скудных естественных пастбищах. В противном случае от тучного корма легко получается вздутие брюха, которое нередко кончается смертью. Поэтому надо следить за животными и быть осторожным.

При хорошем кормлении ягнята дают не менее 200 г привеса, а скороспелые мясные породы до 300—400 г в сутки. Нормальный вес при отъеме у мясошерстных ягнят должен быть 30—35 кг.

После отъема ягням предоставляются лучшие пастбища, и продолжается их подкормка. Кроме подкормки концентрированным кормом необходимо давать сочные корма-корнеплоды или силос в размере 0,5—1 кг в день.

Для нормального роста и развития ягнят необходимо нормированное кормление, причем всегда надо иметь в виду,

что хорошее кормление в молодости дает наилучший экономический эффект.

Хорошее кормление экономически себя оправдывает, тогда как плохое, на первый взгляд кажущееся наиболее дешевым, в конечном счете является убыточным.

При отъеме ягнята разбиваются по полу и содержанию отдельно (баранчики и ягнички). Норма подкормки баранчикам устанавливается несколько выше, чем для ягничек, примерно на 100 г.

Рациональное кормление ягнят по норме дает более высокую оплату корма, т. е. когда на единицу корма получается большая продукция, больший привес, настриг шерсти и др. Наибольший рост и наибольший привес дают ягнята в первый год жизни.

При хорошем уходе и содержании молодняка в результате получают высококачественные во всех отношениях животные.

Т. П.

ЯГНЕНИЕ ОВЕЦ И ВОСПИТАНИЕ ЯГНЯТ В КОЛХОЗАХ

В настоящее время по Союзу ССР производится колоссальных размеров работа по метизации грубошерстных маток с мериносовыми баранами.

Одним из основных моментов, решающих дело метизации, является ягнение. Чем больше будет получено в хозяйстве ягнят, тем больше будет товарность хозяйства, тем больше будет получено на единицу затраченного труда, а следовательно и больше будет дохода от овцеводства.

Каждое хозяйство должно поставить себе целью, чтобы овцы ко времени окота были с хорошей упитанностью тела. Если матка будет худа, то это может отразиться не только на ней, но и на дальнейшем воспитании ягненка: у овцы может быть очень мало молока; ягненок будет голодать, в результате чего — слабое развитие ягненка и даже падеж. Поэтому перед окотом необходимо овец пересмотреть и всех худых выделить в особую

группу, которую подкармливать концентратами.

Для обеспечения нормального ягнения еще до начала окота в овчарне необходимо приготовить: кучки (клетки) для маток с ягнятами из расчета 50 шт. на 1 000 маток размером 1 кв. м; переносные решетки для отделения различных групп овец; колья для прикрепления решеток; фонари «летучая мышь»; матковозки для подвозки в овчарню овец с ягнятами и обратно — обьягнявшихся на пастбище; вилы, лопаты и прочий инвентарь, необходимый для уборки овчарни, а также хорошее сено и концентрированные корма (жмых, отруби).

В последние месяцы беременности и особенно в последние дни необходим особо внимательный уход за овцами. Нужно устранить все условия, которые могут вызвать выкидыш, в частности ни в коем случае не давать заплеоневого корма; следить, чтобы при прогоне через

ворота и при кормлении овцы не теснились и не давили друг друга, и стараться как можно меньше беспокоить овцу.

У некоторых овец, особенно мериносовых, сильно зарастают шерстью глаза.

Для того чтобы овца могла хорошо видеть и свободно двигаться, необходимо шерсть около глаз выстричь.

Всем подсосным маткам следует немедленно выстричь шерсть около вымени, иначе ягненку будет затруднительно сосать.

При выпуске котных маток на пастбище всегда следует пасти их вблизи овчарни, чтобы в случае ягнения на пастбище матку с ягненком можно было бы сейчас же перевести в овчарню.

Так как ягнение проходит круглые сутки, то на ночь должно быть установлено дежурство. Ни в коем случае нельзя поручать дежурство неопытному чабану. Дежурства разрабатываются между старшим и вторым чабанами, хорошо знакомыми с окотом.

В первые 3—4 дня после ягнения матками следует давать только сено; с четвертого дня можно подкармливать концентратами (сильными кормами). Если же овца худя и имеет мало молока, с первого же дня подкармливать ее сильным кормом. В первые дни дача концентрированного корма должна быть малой. Наилучшим кормом в первые дни будут отруби; через 2—3 дня можно прибавить овес, а через неделю — жмых и др. В зимнее время очень полезно давать немного сочного корма.

Для того чтобы вновь народившиеся ягнята лучше и скорее привыкли к своим матерям, сейчас же после окота матку с ягненком следует поместить в клетку (кучу) и держать там, пока они не привыкнут друг к другу (дня 2—3).

Иногда бывает, что ягненок самостоятельно сосать мать не может. Здесь необходима ему помощь овчара. Овчар должен осторожно повалить овцу и путем выдавливания молока пальцами накормить ягненка. Кормить следует таких ягнят до тех пор, пока они не окрепнут и не будут в состоянии сосать мать сами.

Иногда приходится к матке, у которой ягненок пал, подсаживать другого ягненка от матки, окотившейся двойнями. Подсаживание следует производить на ночь и оставлять овцу с подсаженным ягненком в клетке до тех пор, пока они не привыкнут друг к другу. Иногда для

того, чтобы овца приняла чужого ягненка надевают на последнего шкуру с павшего ягненка. Овца, слыша знакомый запах, допускает ягненка к соскам, но этот способ может служить распространением различных болезней и потому применяться не должен.

Особое внимание овчар должен уделить воспитанию двоен. Один из двойни обыкновенно слабее другого, и часто мать заботится только о более сильном; тут нужно умение овчара прийти на помощь слабому ягненку в получении им более полной порции молока. В случаях, когда у овцы не хватает молока, ягнят нужно подпаивать теплым (до 37° С) коровьим молоком. При умелом спаивании коровьего молока ягнята развиваются так же хорошо, как и на молоке матери. Молоко можно спаивать из рожка или из чайника, на носок которого надевается резиновый сосок. В начале ягнят следует кормить 15—18 раз в день, а затем — раз 6.

По мере того как матки и ягнята привыкнут друг к другу, на что обычно требуется 3—5 дней, маток с однопородными ягнятами соединяют в одну группу (по 10—15 маток), обычно называемую «куц» или «сакман». Сакман в хорошую погоду пасется вблизи овчарни весь день. Через неделю сакман увеличивается до 50 голов, причем более слабые ягнята пасутся в самостоятельном сакмане. К трехнедельному возрасту сакман доводят до 150—200 голов, и он уходит на более дальние и лучшие пастбища. В ненастную погоду или холод сакман ставится в овчарню. В двухмесячном возрасте сакман доводят до 400 голов, и уже через 2½—3 месяца формируются стада по 800 голов.

Ягнят необходимо беречь от холода и сырости, так как от холода ягнята простуживаются, а от сырости заболевают поносом.

В возрасте около 2 недель молодой ягненок начинает понемногу есть корм из кормушки своей матери, и овчар должен быть особенно внимательным к его желаниям, чтобы раньше приучить его есть добавочный корм. Для добавочного кормления ягнят устраивают особые помещения (ягнячьи кормушки), в которых могут проходить лишь ягнята. Ввиду малых размеров входного отверстия матки попасть туда не могут.

В этом помещении следует поставить низкую плоскостонную кормушку с продольной перегородкой наверху, чтобы помешать ягнятам впрыгивать в нее. В кормушку надо всыпать немного отрубей, молодого овса или муки из жмыхов. Сперва ягнята будут есть мало, но вскоре сделаются постоянными посетителями кормушки. В кормушку не следует давать больше корма, чем может быть быстро съедено; все, что остается, нужно удалять, и кормушку тщательно вычищать.

С появлением травы овец и ягнят в теплую часть дня следует выгонять на короткое время на пастбище. Переход на пастбище следует производить постепенно. После нескольких часов пастбы на солнце овцы и ягнята должны возвращаться к овчарне, где им должна быть приготовлена обычная порция корма.

Когда трава подрастет и станет пита-

тельной, стойловое кормление можно прекратить.

Ягнята к четырехмесячному возрасту становятся окрепшими и регулярно выпасаются на пастбище около своих матерей. В этом возрасте следует их отнимать от матерей для того, чтобы дать последним время отдохнуть перед случкой и периодом новой беременности. После отъема ягнят следует помещать дальше от маток, чтобы они не могли слышать голоса друг друга. Ярочек необходимо содержать отдельно от баранчиков. В течение нескольких дней после отъема ягнят маток нужно держать на пастбище с низкой травой. Вымя следует осматривать и, если нужно, сдаивать молоко, чтобы не началось воспаления, если матки не ставятся на дойку для брынзоварения.

Д. Белов

КАСТРАЦИЯ И ОТРЕЗКА ХВОСТОВ

Ягнята в 3—4-недельном возрасте просматриваются с целью выбраковки худших баранчиков для валушения (кастрации). В мериновом овцеводстве, где ощущается большая потребность в производителях, допускается выбраковка и валушение только очень небольшого количества совсем негодных животных.

Метисные баранчики, полученные от скрещивания грубошерстных маток с мериновыми баранами или прекос, первого и второго поколений (генерации) должны все кастрироваться. Таких метисов в качестве производителей оставлять не следует, даже несмотря на могущие быть хорошие качества шерсти, крупную фигуру и большой живой вес.

В отношении грубошерстных пород нужно указать, что из приплода оставляются только лучшие баранчики в количестве, необходимом для хозяйства.

Остальные валушатся, так как в дальнейшем валушки, предназначенные на убой, откармливаются лучше и быстрее, чем баранчики.

При просмотре и выбраковке учитывается здоровье и развитие ягнят. Здоровые, хорошо развитые и хорошо сложенные ягнята с крепким костяком оставляются на племя. Недоразвитые с порочными формами выбраковываются.

У шерстных и мясо-шерстных пород нужно обращать внимание на шерсть. Хотя в таком возрасте весьма трудно окончательно судить о качестве шерсти, но существуют известные признаки, которые ее характеризуют. Так малая складчатость по туловищу ягненка говорит за то, что шерсть будет густая. Очень короткая шерсть нежелательна. Более длинная указывает, что во взрослом состоянии годовичная шерсть будет по длине не меньше 7 см. Такая шерсть называется камвольной и очень высоко расценивается промышленностью, так как идет на гладкие камвольные шерстяные ткани. Присутствие грубого ягнячьего волоса говорит за то, что у таких животных шерсть будет впоследствии грубой и более низкого качества.