

В этом помещении следует поставить низкую плоскостонную кормушку с продольной перегородкой наверху, чтобы помешать ягнятам впрыгивать в нее. В кормушку надо всыпать немного отрубей, молодого овса или муки из жмыхов. Сперва ягнята будут есть мало, но вскоре сделаются постоянными посетителями кормушки. В кормушку не следует давать больше корма, чем может быть быстро съедено; все, что остается, нужно удалять, и кормушку тщательно вычищать.

С появлением травы овец и ягнят в теплую часть дня следует выгонять на короткое время на пастбище. Переход на пастбище следует производить постепенно. После нескольких часов пастбы на солнце овцы и ягнята должны возвращаться к овчарне, где им должна быть приготовлена обычная порция корма.

Когда трава подрастет и станет пита-

тельной, стойловое кормление можно прекратить.

Ягнята к четырехмесячному возрасту становятся окрепшими и регулярно выпасаются на пастбище около своих матерей. В этом возрасте следует их отнимать от матерей для того, чтобы дать последним время отдохнуть перед случкой и периодом новой беременности. После отъема ягнят следует помещать дальше от маток, чтобы они не могли слышать голоса друг друга. Ярочек необходимо содержать отдельно от баранчиков. В течение нескольких дней после отъема ягнят маток нужно держать на пастбище с низкой травой. Вымя следует осматривать и, если нужно, сдаивать молоко, чтобы не началось воспаления, если матки не ставятся на дойку для брынзоварения.

Д. Белов

КАСТРАЦИЯ И ОТРЕЗКА ХВОСТОВ

Ягнята в 3—4-недельном возрасте просматриваются с целью выбраковки худших баранчиков для валушения (кастрации). В мериновом овцеводстве, где ощущается большая потребность в производителях, допускается выбраковка и валушение только очень небольшого количества совсем негодных животных.

Метисные баранчики, полученные от скрещивания грубошерстных маток с мериновыми баранами или прекос, первого и второго поколений (генерации) должны все кастрироваться. Таких метисов в качестве производителей оставлять не следует, даже несмотря на могущие быть хорошие качества шерсти, крупную фигуру и большой живой вес.

В отношении грубошерстных пород нужно указать, что из приплода оставляются только лучшие баранчики в количестве, необходимом для хозяйства.

Остальные валушатся, так как в дальнейшем валушки, предназначенные на убой, откармливаются лучше и быстрее, чем баранчики.

При просмотре и выбраковке учитывается здоровье и развитие ягнят. Здоровые, хорошо развитые и хорошо сложенные ягнята с крепким костяком оставляются на племя. Недоразвитые с порочными формами выбраковываются.

У шерстных и мясо-шерстных пород нужно обращать внимание на шерсть. Хотя в таком возрасте весьма трудно окончательно судить о качестве шерсти, но существуют известные признаки, которые ее характеризуют. Так малая складчатость по туловищу ягненка говорит за то, что шерсть будет густая. Очень короткая шерсть нежелательна. Более длинная указывает, что во взрослом состоянии годичная шерсть будет по длине не меньше 7 см. Такая шерсть называется камвольной и очень высоко расценивается промышленностью, так как идет на гладкие камвольные шерстяные ткани. Присутствие грубого ягнячьего волоса говорит за то, что у таких животных шерсть будет впоследствии грубой и более низкого качества.



Каракульские ягнята

Густая, длинная, средней тонины шерсть дает большой настриг.

Просмотр каракульских ягнят нужно производить в 3—4-дневном возрасте и обращать главное внимание на качество смушка — форму завитка, рисунок и блеск. В более позднем возрасте смушки ухудшаются, так как с отрастанием волос завитки теряют свое качество. Лучшими смушками считаются вальковатые и бобастые. Затем идут кольчатые и с гривками. Худшие имеют форму завитка горошка или штопора. Ягнята с таким смушком не должны оставаться на племя. Также бракуются ягнята, имеющие белые пятна на туловище.

Выбракованные баранчики кастрируются. Кастрация производится самими чабанами, до наступления жаркого времени, так как при жаркой температуре заживление идет медленнее, ранки загрязняются, и мухи откладывают яички, из которых развиваются личинки, так называемые «черви». При этом получается большой отход ягнят. Наиболее простой способ кастрации следующий: кожа мошонки с двух сторон надрезается чистым ножом; затем выдавливаются пальцами и вытягиваются зубами семенники (яички) с семенным канатиком. Эта операция проходит быстро и легко. Ягнята очень скоро приходят в нормальное состояние, и отход бывает самый незначительный, выражающийся в долях процента.

У культурных пород — мери-осоз, преросов и английских мясных (линкольны, гемпширы,, шропширы, ромни-марш) —

у ягнят одновременно с кастрацией отрезаются острым ножом или щипцами хвосты до 2—3 позвонка. Отрезка хвостов преследует следующие цели: при длинном хвосте сильно загрязняется шерсть, что понижает ее качество и следовательно обесценивает ее; бараны же гораздо лучше кроют маток, имеющих короткие хвосты, не закрывающие половые органы.

Эта операция также очень проста, и заживление происходит быстро.

Если валушение и обрезка хвостов проводится в прохладное время в чистом помещении или на свежем воздухе в хорошую погоду без нарушения простейших требований зоогигиены, то это не оказывает влияния на развитие ягнят и не увеличивает отхода. К простейшим требованиям зоогигиены относятся: чистое помещение, чистый нож или щипцы, которыми производят операцию, халат или фартук для чабана и чисто вымытые руки.

Желательно иметь дезинфицирующие средства для дезинфекции ножа и рук оператора-чабана.



Кастрация баранчиков

Кастрацию и обрезку хвоста никоим образом нельзя производить в дождливую, сырую погоду. Дождь, слякоть, сильный ветер predispose ягнят к заболеваниям и тормозят заживление после этих операций. При небрежном отношении отход ягнят значительно увеличивается.

Т. П.