

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВЕЦ В КОЛХОЗАХ

Хорошая упитанность овец при переходе с пастбищного содержания на стойловое очень важна как для предстоящей случной кампании, так и для перезимовки их. Когда овцы находятся в состоянии хорошей упитанности, то в зимний период падеж их бывает меньше. Во время случки у маток лучше проявляется охота, что ведет к меньшему проценту яловых и большему выходу ягнят. Кроме того наибольший прирост шерсти у мериносов приходится как раз на период летнего содержания (июнь, июль, август), когда, по данным опытной станции «Чапли», прирост доходит ежемесячно до 11—13% всего годового количества снимаемой с овец шерсти.

Поэтому, правильно организованное летнее содержание овец увеличивает продуктивность, а следовательно и товарность овцеводства.

Прежде чем выгонят овец на пастбище, необходимо осмотреть и то и другое.

В стаде часто оказываются слабые животные, которых необходимо выделить и пастись отдельным стадом, добавляя к пастбищному корму концентраты.

При осмотре овец необходимо устранить все, что, препятствует свободному передвижению животного.

Необходимо внимательно осмотреть копыта: они за зиму сильно отрастают и мешают правильному движению овец. Копыта следует обрезать и хорошенько расчистить. У мериносовых овец сильно отрастает шерсть около глаз, на внутренней поверхности задних ног и около хвоста, мешая свободно двигаться. На этих местах шерсть необходимо остричь.

Участок, который отводится для пастбы овец, необходимо тщательно осмотреть. Сырые, болотистые участки для пастбы овец не годятся. На таких участках овцы заболевают глистами, от которых бывает падеж овец, особенно молодняка.

Сырые пастбища также являются причиной копытных заболеваний, нарушающих нормальный выпас овец.

Пастбища очень часто бывают засорены вредными травами, как например: вошом, рахитником, наперстянкой, безвременником, лютиком, чемерицей, болиголовом и др. От этих трав пастбище

следует освободить, так как они вызывают заболевание овец. Участки должны отводиться сухие. Лучшими пастбищами будут: целинная степь, твердая и мягкая залежь, горные пастбища и жнивье.

При наличии таких участков, ранней весной овцы выпасаются первоначально на целинной степи и твердой залежи. Сперва овцы собирают уцелевшую с прошлого года засохшую на корню траву и по мере отрастания молодой травы незаметно переходят на свежий зеленый корм. Пастба на этих участках проводится до момента запрещения покосов. С момента запрещения покосов пастба производится на худшей целине и залежи (лучшая оставляется для сенокоса). После стрижки пастбу можно проводить на мягких залежах.

После уборки хлебов овцы перегоняются на жнивье, где, поедая хлебные колосья и зеленый покров сорняков, быстро нагуливаются. К этому времени на скошенных лугах появляется ютава, где овцы также могут выпасаться, находя великолепный сочный корм.

К моменту выпуска овец на пастбище необходимо произвести формирование и комплектование отар.

Отары формируются по породам, полу и возрасту. В тех колхозах, где овцы разбиты на классы, отары формируются также и по классам. При формировании отар можно допустить в случае необходимости соединения ярочек с валушками.

Организовав отары, для каждой из них отводят определенные выпасные участки. При распределении их необходимо наилучшие пастбища отводить племенным отарам, молодняку, маточным отарам; наихудшие пастбища отводятся валухам.

Баранам, как наиболее сильно страдающим от жары, необходимо отводить пастбища вблизи овчарен, с тем чтобы на жаркую часть дня иметь возможность ставить их в тень. Если вблизи сараев их держать по каким-либо причинам нельзя, то хорошо устраивать на пастбищах легкие навесы, где бараны могли бы стоять в жару.

Количество выпасов, потребное для отдельных отар, определяется на месте в зависимости от районов и качества пастбища. Так как в это время проходит

окот, то лучшие пастбища около овчарен отводятся для маток. Пастьба обычно начинается с валухов, затем выгоняют маток, баранов и в последнюю очередь ягнят.

Очень важным в выпасе овец является распределение времени в течение суток между пастьбой и отдыхом. Но постоянного, раз навсегда установленного чередования времени установить нельзя, так как распорядок дня зависит от целого ряда условий: от погоды, времени года, характера выпасного участка, степени упитанности овец и пр. Распорядок дня устанавливается старшим овчаром с соблюдением следующих основных положений. В раннее весеннее время овец утром подкармливают в базе сеном, после чего выгоняют на пастбище. Вечером по возвращении с пастьбы овцам задают сена и, когда они наедятся, загоняют на ночь в овчарню. Когда зеленого корма на пастбище будет достаточно, то подкормку в базе прекращают, и овцы пользуются исключительно одним пастбищем. Когда установится теплая погода, то овец в овчарню не загоняют, а почевку проводят на свежем воздухе, на защищенном от ветра месте — тырле. Утром овец с тырла трюгают лишь после того, как сойдет роса. Ни в коем случае нельзя пастись овец по росе, после сильного дождя по холодной сочной траве; такая пастьба может вызвать вздутие брюха, простуду и заболевание копыт. Особенно в этих случаях надо быть осторожным по отношению к ягнятам. В период, когда еще не наблюдается большой жары, овцы пасутся весь день и на тырло возвращаются только на ночь.

С наступлением жарких дней овцы (в жаркие часы) должны становиться на тырло, так как в это время они не едят, а скучиваются, чтобы спрятать голову от солнечных лучей.

Дневное тырло следует выбирать на открытом возвышенном месте с свободным доступом воздуха. Останавливать отару в ложбинах с высокой травой ни в коем случае нельзя, так как могут быть случаи «запаривания». После спадения жары опять гонят овец пастись. Пастись следует овец до тех пор, пока они не наедятся.

Тырло, или место стоянки, меняется лишь тогда, когда корм вблизи стравлен. При выгоне овец на пастбище утром их не сразу следует пускать на свежий

участок, а сначала пускают на площадь, служившую уже для пастьбы 1—2 раза, а затем постепенно по мере насыщения перегоняют на свежую траву. Такой порядок выпаса даст возможность более полно использовать пастбище.

Овцы должны пастись спокойно, итти равномерно длинной лентой, иначе сильные овцы съедят лучший корм, а более слабые не столько наедаются, сколько нагоняют сильных, почему отара бывает неодинаково накормлена. Чтобы избежать этого, двое из овчаров идут впереди отары, сдерживая и выравнивая ее, а третий идет сзади, подгоняя отстающих животных.

При пастьбе необходимо учитывать направление ветра и солнца. В более холодную часть года утром овец с тырла следует гнать против ветра, с тем чтобы вечером, когда сделается холодно, можно было гнать овец к тырлу по ветру. В теплую часть года наоборот — утром отару гонят по ветру, а с наступлением жары следует гнать на тырло против ветра. Солнце должно быть всегда сбоку или сзади, иначе овцы неохотно пасутся, плохо видят, много затаптывают корма. На тырле овцам в особых корытах должна задаваться соль. Лучше давать соль-лизунец (комовую). В тех хозяйствах, в которых такой соли нет, можно задавать обычную соль, но ее следует задавать без перерывов. Если случаются перерывы, то дачу соли надо производить осторожно, чтобы не обкормить овец. В этих случаях хорошо соль смачивать дегтем, так как овцы не с такой жадностью поедают ее. Большое значение для развития овцеводства целого ряда районов должны иметь искусственные пастбища. По данным опытных станций, нагрузка искусственных пастбищ овцами на единицу площади до семи раз больше нагрузки естественных пастбищ. Пользоваться клеверными и люцерновыми пастбищами надо очень осторожно, так как овцы на таких пастбищах часто заболевают тимпанитом (вздутие брюха). Чтобы избежать этого, овец надо приучать к этим пастбищам постепенно.

В первые дни овец следует выпускать на несколько минут предварительно накормленными, с течением времени срок пребывания следует увеличивать. Самое лучшее и целесообразное использование искусственных пастбищ может быть параллельно с пастьбой на степных пастби-



Удаление червей пинцетом

цах. Этим, во-первых, увеличивается срок пользования этими пастбищами, а во-вторых, исключается возможность заболевания овец тимпанитом.

Говоря о летнем содержании овец, необходимо коснуться вопроса водоснабжения и поения их.

Обычно на водопой и его качество у нас мало обращается внимания. Летом часто овцы поятся из болот, прудов и прочих закрытых водоемов. От этого происходят всевозможные заболевания овец, сопровождающиеся падежом. Эта система поения овец в овцеводческих хозяйствах не должна иметь место. Если нет источника, дающего хорошую воду (реки, родника), то на выпасах должны быть устроены шахтные или буровые колодцы. Производительность колодцев

должна покрывать полностью ежедневную потребность в воде во время поения.

Лучше поить овец после дневной стоянки перед выгоном на пастбище. Надо остерегаться поить разгоряченных овец. Нельзя сразу к корытам подгонять всю отару, так как овцы будут давить и мять друг друга. Обычно отару останавливают на некотором расстоянии от колодца и, отделяя полов по 200, постепенно напоят всю отару.

Необходимо следить, чтобы около колодцев был порядок, не образовывались выбоины и лужи. Так как при поении овцы, теснясь около колодцев, поднимают пыль и следовательно загрязняют шерсть, необходимо перед поением землю вокруг колодцев слегка смочить водой. Водопойные корыта должны содержаться в чистоте и после водопоя промываться от грязи и песка.

Основную работу обслуживающего персонала в период летнего содержания должна составлять борьба с чесоткой и с зачервлением овец. Главной мерой борьбы с чесоткой является купание овец в противочесоточных растворах, но кроме этого летом необходимо осматривать всех овец и при обнаружении чесотки применять местное лечение. Все пораженные чесоткой места растираются и разминаются руками для удаления корки и затем заливаются 5-процентным раствором креолина или скипидаром. Второй заботой овчаров в летнее время является борьба с зачервлением овец. Черви являются очень сильным врагом овцеводства; неумелая и несистематическая борьба с ними ведет к тому, что червивые отары худеют и теряют упитанность. Все поражения, которые бывают у овец, необходимо смазывать пахучим дезинфицирующим средством, дегтем, креолином или же маслом оленьего рога со скипидаром. Это не дает мухам откладывать свои яйца в ранки. Если окажутся червивые овцы, то необходимо у таких овец пинцетом выбрать всех червей и червивую ранку залить также дезинфицирующим пахучим средством.

Д. Белов