

Готовьтесь к случной кампании

Метизация овец в колхозах

Основным мероприятием по улучшению качества наших грубошерстных овец является метизация.

По плану Колхозцентра в 1931 г. должно быть метизировано в колхозах 2,5 млн. грубошерстных маток. Для этой цели потребуется 83 тыс. баранов; 32 тыс. баранов намечено заготовить через систему с.-х. кооперации и 51 тыс. получить из совхозов Овцеводтреста.

Метизация будет проводиться мериновыми, цыгайскими и мерино-цыгайскими баранами.

Широкий размах этого мероприятия заставляет колхозы обратить особое внимание как на организационную сторону дела, так и на технику самой метизации.

В первую очередь необходимо, чтобы метизация грубошерстных маток мериносами проводилась в колхозах с крупными обобщественными товарными стадами, с количеством не менее тысячи голов маток, так как здесь достигается наиболее целесообразное содержание и использование как баранов-производителей, так и маточного состава.

Такое колхозное хозяйство должно быть обеспечено хорошими сухими пастбищами и водопоями.

Пойть овец необходимо колодезной или чистой проточной водой, не допуская ни в коем случае поения из стоячих луж или болот, так как от застойной воды овцы заражаются глистами и болеют.

Помещение для овец должно быть просторное, светлое, чистое, сухое, с хорошей вентиляцией и оборудовано кормушками и яслями. Полы в овчарне должны быть земляные. Бараны, матки, ярки и ягнята должны содержаться отдельно,

причем для ягнят и котных маток должно отводиться более теплое помещение. Содержать овец нужно по возможности на воздухе и только во время дождя и сильных ветров зимой загонять в овчарню. Летом бараны должны пастись отдельно от маток. На время случного периода ярки моложе полутора лет также отделяются от маток.

При отборе маток для метизации нужно обращать особое внимание на то, чтобы матки были в возрасте не менее 1½ лет и не старше 4½ лет, и чтобы они были нормального веса и роста, т. е. не менее среднего роста и веса для данной породы и обязательно хорошего сложения.

Главными признаками нормального развития овцы являются: крепкий костяк, покрытый развитой мускулатурой; широкий, округлый, на прочных ногах корпус. Кроме того матки должны иметь правильно развитые и здоровые молочные железы и соски.

Наилучшими для метизации являются овцы с белой шерстью, затем светло-рыжей и рыжей. Отбор маток с черной шерстью допускается только в том случае, если овец с белой шерстью в районе нет.

Шерсть метизируемых маток на ощупь должна быть возможно более нежной, иметь хороший блеск, длину и достаточную густоту при относительно хорошей оброслости брюха. Бараны-производители кроме хорошо развитого корпуса должны иметь нормальные половые органы с достаточно развитыми яичками (тестискулами). С недоразвитыми тестискулами или с одним яйцом бараны для метизации допускаться не должны.



Группа мериносовых баранов породы рамбулье

Мериносовые бараны, предназначенные для метизации, должны быть не ниже средней упитанности, вполне здоровые, энергичные, удовлетворительного сложения и оброслости, в возрасте от 2½ до 4½ лет, при живом весе не ниже 52 кг.

Ввиду недостатка баранов могут быть пущены в случку и бараны 1½-летнего возраста, но хорошего сложения и роста, хорошей упитанности и энергии и вообще вполне способные покрыть матку.

Ввиду сильной распространенности чesотки среди мериносов необходимо всех баранов, поступающих в хозяйство для метизации, в целях предупреждения возможности заражения овец поместить в отдельное помещение на 20 дней, подвергнув купанию или окуливанию, после чего с разрешения ветеринарного врача пускать их в случку.

Случка

Случку желательно проводить в течение одного месяца (с ноября по декабрь) с таким расчетом, чтобы охот был приурочен к началу пастбищного периода (беременность овцы продолжается около 5 месяцев).

Случка должна применяться ручная. Кавказским мериносовым бараном в возрасте от 2½ лет в течение случного периода можно допускать покрытие в среднем 50—60 маток и 1½-летним бараном — не более 20—25 маток. Каждому барану нужно подпускать в день не более двух маток.

За месяц до случки и во время всего случного периода баранам необходимо давать добавочно к их пастбищному корму ежедневно 0,6—0,8 кг овса на голову. Овес дается в загонках в конце дня.

Для отыскания овец, пришедших в охоту, пускаются в отару энергичные грубошерстные бараны-пробники с подвязанными фартуками. Баран-пробник пускается в отару утром. Всех овец, пришедших в охоту, удаляют из отары и загоняют в базы, где происходит случка. При случке один человек держит матку, другой выпускает мериносового барана и помогает ему, отводя в сторону хвост матки (например у волошской овцы). Покрытых маток метят, отделяют от общего стада и пасут отдельно. Для проверки через 10—12 дней к ним снова пускают пробника для отыскания неоплодотворенных маток; которые снова покрывают мериносовыми баранами. В случае если мериносовые бараны ростом меньше метизируемых маток, то последних во время случки ставят в углубление, вырытое в земле (яму).

Учет метизации

Работа по метизации должна сопровождаться специальным учетом всех затрат и достижений.

Необходимо регистрировать число маток и баранов, пущенных в метизацию, яловость маток, приплод — метисный и грубошерстный, отход ягнят, баранов и маток.

К. Шуминский