

О МЕТИЗАЦИИ МЕСТНОЙ СЕВЕРНОЙ КОРОТКОХВОСТОЙ ОВЦЫ РОДОМ МЕРИНО-ПРЕКОС НА СИБИРСКОМ ОПОРНОМ ПУНКТЕ

В случную кампанию 1930 г. на Новосибирском опорном пункте были покрыты двадцать четыре матки бараном прекоса, местной северной короткохвостой породы. В случку матки пошли в весьма хорошем состоянии и питании и имели средний живой вес 45 кг. Баран-прекос, с которым случались матки, был хорошо телосложения с живым весом 77 кг и типичный для этой породы.

Весною на следующий год от всех 24 покрытых маток было получено сорок семь ягнят. Яловой не осталось ни одной матки. Процент окота таким образом был равен 195.

Ягнись матки одиночками, двойнями и тройнями в следующем соотношении: одиночками — 4 матки, или 16,66%, двойнями — 17 маток, или 70,84%, тройнями — 3 матки, или 12,50%.

То же самое наблюдается при скрещивании этой же местной овцы (в 1929 г.) с волошскими кучугуровскими Саранами. Там процент двоен равнялся 80.

В том и другом случае несомненно сказывается высокая плодовитость местной сибирской короткохвостой овцы.

В отношении развития и состояния молодняка в первые дни его жизни можно отметить целый ряд положительных явлений.

При рождении ягнота из двоен весят в среднем 3 кг; для одиноцов живой вес несколько выше.

После рождения ягнота сразу проявляют большую самостоятельность и быстро привыкают к матери.

Десятидневные ягнота наряду с матерями начинают поедать сено, солому и подкормку (овес, отруби) и даже иногда пьют воду.

При специальной подкормке ягнят сильным кормом в 3—4-недельном возрасте ягнота с'едали по 200—250 г сильного корма на голову в сутки.

Скороспелость ягнят метисов-прекос, их интенсивный рост в раннем возрасте и потребность к обильному кормлению — есть результат влияния уже в первом поколении породы меринос-прекос.

Неприхотливость ягнят метисов-прекос к условиям ухода и содержания видна из

того, что за время окота пали только 1 ягненок (два от тройни и один выкидыш). Полученный приплод был весьма устойчив к низкой температуре (часть маток ягнись в начале февраля), в скотном помещении; заболевания на почве простуды не было ни одного случая. То же самое нужно сказать и в отношении других заболеваний.

Относительно передачи масти по наследству при метизации местной короткохвостой овцы с меринос-прекос в первом поколении получены такие данные: все матки, за исключением одной (белой), от которых был получен приплод, имели черную масть, у некоторых присутствовала седина или бурый оттенок шерсти и были малые отметины на затылке, кончике хвоста и конечностях.

Из сорока семи ягнят белых было 12 ягнят, или 25%, и черных родилось 35 ягнят, или 75%. Приблизительно у половинного количества ягнят, так же как и у маток, наблюдались отметины: у белых ягнят присутствовали темноты на туловище, конце морды и ушах, у черных ягнят малые белые отметины на затылке, хвосте и ногах.

Таким образом здесь подтвердилось доминирование у овец черной масти над белой (белых 25%, черных 75%), а также можно предполагать, что у местной овцы признак черной масти находился в гомозачаточном состоянии.

Строение завитка на смушках новорожденных ягнят-метисов более напоминает смушек ягнят местной породы овец: завиток или совсем отсутствует или выражен очень незначительно, благодаря чему наблюдается почти гладкая поверхность шерстного покрова у новорожденных. Люстра на шерсти смушки отсутствует. Шерсть значительно гуще, нежели у ягнят местной породы.

Приблизительно в месячном возрасте у ягнят-метисов появляются отдельные косички шерсти. Оброслость рунной шерстью лицевой части головы, как ниже скакательного и коленного сустава, отсутствует. Этот признак стойко передается потомству от прекоса и местной си-

Российской короткохвостой тонкохвостой овцы.

вадет опасение в развитии этого дела. Кроме того имеет большое значение высокая плодовитость местной овцы, что также наравне с другими полезными признаками (невосприимчивость к болезням и пр.) должно иметь место и в последующих генерациях.

Холомейзер В. Г.

Ст. Марьяновка Омск. ж. д. Совхоз Овцевод.

В каком возрасте нужно кастрировать ягнят и обрезать им хвосты

В № 4 журнала «Овцеводство» напечатана статья «Кастрация и отрезка хвостов». В этой статье автор указывает, что кастрировать ягнят и обрезать им хвосты нужно в 3—4-недельном возрасте. Это неверно, так как у ягнят в то время уже жиреют хвост и мошонка и они тяжело переносят операцию и бывает падеж их.

Рекомендую кастрировать ягнят и обрезать им хвосты на 6—7-й день. В этом возрасте ягнята еще не успевают ожиреть и легко переносят кастрацию и отрезку хвостов.

В 1928 и 1929 гг. я кастрировал по 10 тыс. ягнят в 3—4-х недельном возрасте и имел отход от кастрации и обрезки хвостов по 100 голов в год.

В 1930 и 1931 гг. я кастрировал по 17 тысяч ягнят, но уже в 6—7-дневном возрасте, и у нас не пало от кастрации и обрезки хвостов ни одного ягненка.

Пом. овцевода Соловьев И. А.

Совхоз № 3 Овцевод Сев.-Кав. края.

Как собака может помочь пасти овец

Во всех странах мира при уходе за овцами в овчарне и на пастбище применяется собака — верный и умный друг человека.

Пастыба огромных стад по 3—5 тыс. голов в Северной Америке и Австралии была бы совершенно невыполнима без помощи собак. Огромные отары пасутся под охраной одного конного пастуха и пары собак. При скудных пастбищах овцы пасутся враспынную, и пастух не успел бы собирать овец в кучу.

Когда нужно итти на водопой или перейти на новое пастбище, собаки собирают стадо в кучу, пастух едет впереди, указывая дорогу, а собаки, одна с правой, а другая с левой стороны, подгоняют овец. Ни одна овца не отобьется от стада и не погибнет при перегоне. Эту работу собака выполняет лучше человека.

Инстинкт и обоняние помогают ей в темноте ночи. Она осмотрит все кусты и овражки и отыщет отставшую овцу. Если собака устала, заболела и не может итти дальше, то собака громким лаем дает об этом знать пастуху.

Среди ночи в бурю и непогоду измокшая собака кружится около стоянки овец, не позволяя им уйти с указанного места.

Конечно, прежде чем проводить такую работу, собака проходит хорошую школу. Щенок приучается при матери и тогда уже знакомится со всеми своими будущими обязанностями.

При дрессировке много раз приходится терпеливо повторять один и тот же прием, прежде чем молодая собака поймет, что от нее требуется. Изредка приходится применять строгость, но исключительно в случае упорства собаки и нежелания выполнять уже хорошо знакомый прием.