

ОВЦЕВОДСТВО КАРАЧАЯ

В сельском хозяйстве Карачаевской автономной области животноводство занимает 90—95%. Овцеводство в животноводстве области занимает второе место. На первом месте стоит крупный рогатый скот мясомолочного направления.

В период с 1905 г. по 1925 г. вследствие ряда неурожайных лет, империалистической и гражданской войн Карачаевское овцеводство шло по пути сокращения.

С 1926 года наступил восстановительный период, и к 1929 г. овцеводство почти достигло уровня 1905 г. За последние два года замечается абсолютное и относительно понижение овечьего поголовья вследствие хищнического уничтожения и разбазаривания его кулацкой и зажиточной частью населения, в руках которых было сосредоточено свыше 50% всех овец области. По состоянию на 1 апреля 1931 г. из общего поголовья овец области 45% находилось у кооперированного населения и 34%, или 68 160 голов, находилось в колхозном секторе; из них 15%, или 34 080 голов, — в общественном пользовании.

В основной своей массе овцеводство области состоит из карачаевских овец. Имеется небольшое количество мериновских, каракулевых и их метисов, но их роль в экономике овцеводства Карачая очень незначительна.

Карачаевская порода овец относится к группе мясо-шерстно-молочных, жирношестых овец, отличающихся большой выносливостью и неприхотливостью к кормам. Карачаевские овцы хорошо приспособлены к горным условиям, после зимнего истощения (от скудного содержания) быстро поправляются на летнем пастбище и накапливают жир. Средний живой вес овец — от 40 до 48 кг, баранов — от 48 до 68 кг.

В хозяйствах, ведущих отбор, овцы достигают до 64 кг живого веса, а бараны — до 80 кг. Мясо карачаевских овец отличается хорошим вкусом.

Шерсть карачаевских овец в большинстве черная, встречаются серые и реже белые. Шерстность карачаевских овец небольшая благодаря плохому содержанию. За две стрижки от взрослой овцы получается 1,1—1,2 кг грязной шерсти (весенняя

стрижка 300—400 г, осенняя — 700—800 г). Пуха в шерсти имеется до 50—60%. Шерсть карачаевских овец не отличается большой тониной, но в ней нет очень грубых волос, какие часто встречаются в руне некоторых малокультурных пород. Способность сваливаться и образовывать плотный прочный войлок делает шерсть карачаевских овец пригодной для приготовления войлочных изделий, бурок, шляпок и т. д.

Товарность карачаевской шерсти по области в среднем составляет 72—75%.

Молочная продуктивность овец небольшая. За 4—5 месяцев удойного периода овца дает от 24—до 48 кг молока с количеством жира до 11%.

Плодовитость овец небольшая, двойни очень редки. Приплод овец колеблется от 90—92%. Падеж и гибель в настоящих условиях для взрослых овец 5%, для ягнят — 10%.

При правильном разведении, кормлении и содержании овец мясность и шерстность их значительно повышается, и овца становится более доходной. По опытам племхоза, при правильном воспитании молодняка 6-месячные баранчики весили 31 кг и ежедневно прибавлялись в весе от 320 до 330 г. Нужно отметить, что согласно опытным данным прирост карачаевских ягнят ничем не уступает приросту мясных английских пород. По тем же данным, шерстность карачаевской овцы может также повышаться. Так например в первый год ро-



Карачаевский баран 5½ лет.



Карачаевская матиз

ждения баранчик шерстной группы в осеннюю стрижку дал 1,29 кг шерсти, весной 1-го года—0,52 кг, осенью в 1½ года—1750 кг, всего за год дал 2,27 кг шерсти. Он же в 1930 г. осенью дал 2,1 кг шерсти.

В настоящее время проводится опытная работа по метизации карачаевских овец с каракульскими баранами в целях изучения характера улучшения смушка. Получены уже метисные ягнята 1-й и 2-й генераций, по которым можно проследить, что каракульский баран передает по наследству тип головы, хвоста и характер смушка в массе с кольцевидным, менее упругим матовым завитком.

Метисные ягнята при рождении весят до 5,2 кг.

Каракульских овец в Карачае насчитывается 97 голов, из них 82 барана. Каракульские овцы и бараны были завезены в 1929 г. областным земельным управлением из Бухары для целей опытной метизации.

По данным наблюдений, отмечается, что в условиях Карачая, где весна и начало лета дождливые, а на летних пастбищах часто выпадает снег и град, у каракульских овец появляется сапота вследствие простуды, и животные плохо себя чувствуют. В то же время карачаевские овцы подобные условия переносят превосходно.

Малейшее понижение температуры уже неблагоприятно действует на каракульских овец. Жизнеспособность каракульских овец может быть улучшена, если обеспечить их в плохую погоду на горных летних пастбищах теплыми загонами и в зимнее время—овчарнями, чего в

настоящее время не имеется и при горных условиях выпаса овец по скалам возможность устройства загонцов затруднена. Затем нужно отметить, что каракульские овцы менее приспособлены к передвижению по горам, чем карачаевские, что еще больше увеличивает их неприспособленность к данным условиям. На плоскостной части Карачая при условии культурного содержания каракульские овцы могут разводиться и в чистоте.

Проводится опытная работа по метизации карачаевских овец с липкольскими баранами. Судя по ягнятам первой генерации можно сказать, что вес животного в результате метизации заметно увеличивается, шерсть становится более однородной и с большим настригом. Однако эти опыты требуют дальнейших наблюдений, которые сейчас и проводятся.

Мериносовых овец в Карачае насчитывается не больше 800 голов, их можно встретить единицами и десятками почти по всем аулам.

Мериносовые овцы в Карачай завезены из соседних районов и представляют собой выродившихся животных, по которым трудно установить, к какому типу они относятся (небольшой вес, слабый костяк, плохие формы телосложения, плохое качество и количество шерсти по сравнению с типичными мериносами).

Можно встретить метисов от карачаевских овец и мериносовых баранов и обратно. Результаты метизации дают животных с более тонкой и однородной шерстью, чем у чистых карачаевских овец, коричневого цвета, не пользующейся фабричной ценностью, с еле заметной извитостью без замкнутости руна, со слабо выраженными косичками. Экстерьер метисных животных—с слабым костяком и плохими мясными формами без жировых отложений на хвосте. В целом животные получают с пониженной жизнеспособностью.

Случка животных производится вольная. Случной период начинается с середины ноября, а по некоторым хозяйствам—с начала и середины декабря и продолжается 4—5 недель с тем расчетом, чтобы окот произошел с наступлением теплого времени и появлением травы. Массовый окот приходится на май.

Бараны и овцы идут в случку с полугоралетного возраста. Баранов в стадо овец пускают в среднем из расчета 4—5 голов на 100 маток.

Бараны в период случки сильными кормами не подкармливаются. После летних выпасов они в случку идут в хорошо упитанном состоянии.

Отбивка ягнят производится постепенно осенью в августе—сентябре в 4-месячном возрасте. В тех случаях, когда доят овец, ягнят с месячного возраста на день отделяют от маток и выпасают близ кошей отдельно, подпуская их только для подкормки в обед.

Карачаевское овцеводство носит полупастбищный характер с пастбищным содержанием на протяжении всего времени. Основное овчье стадо в зимнее время находится на зимних пастбищах, расположенных по пригревам, в местах, защищенных от резких зимних ветров (по ущельям, балкам). Зимой, когда пригравные выпасы покрываются снегом, производят подкормку овец сеном, разбрасывая его по снегу.

С наступлением весеннего теплого времени и появления травы овчье стадо по заказу выпасаются по сенокосным угодиям. С середины мая, с заказа сенокосных угодий, овчье стадо перегоняется на летние горные пастбища на расстоянии 60—100 км от аулов. К этому времени горы освобождаются от снега и покрываются зеленой альпийской растительностью. На горных летних пастбищах овцы находятся по сентябрь и по мере прикрития гор снегом спускаются все ниже и ниже и к октябрю возвращаются на отавы сенокосов, где выпасаются до начала декабря, после чего идут к местам зимних стоянок и выпасов.

На летних пастбищах для овец не отводится специальных участков, они выпасаются совместно с другими видами скота. Разбивки пастбищ по участкам для рационального использования не производится, вследствие чего пастбища быстро лишаются зеленой растительности.

На зимних и летних пастбищах и в местах стоянок овцы всегда пользуются лучшей родниковой проточной водой в достаточном количестве. Вследствие того, что горные пастбища и горное сено бедны зольными веществами, овцам дают соль, разбрасывая ее на пастбище.

Вообще нужно сказать, что карачаевское овцеводство — экстенсивно, нет правильного разведения, кормления, ухода и содержания. Только в последнее время намечается сдвиг в карачаевском овцеводстве в сторону его улучшения.

Карачаевское овцеводство должно идти по пути улучшения, т. е. путем правильного разведения, кормления, ухода и содержания в основном карачаевских овец, тем самым добиваясь повышения мясной и шерстной продукции. На более плоскостной части Карачая в Майкопско-карачаевском округе можно допустить метизацию карачаевских овец с каракульскими баранами в целях улучшения смушка методом пологотительного скрещивания. Широко увлекаться метизацией карачаевских овец с каракульскими баранами не следует. Так как в погоне за получением смушка мы ухудшим мясные и шерстяные качества карачаевских овец.

Животноводческий съезд 1929 г. во Владикавказе определенно высказался за метизацию карачаевских овец с каракульскими баранами только на плоскости.

Метизацию мериносовыми баранами проводить не следует. Подобная метизация создает в карачаевском овцеводстве вырожденных животных с пониженной жизнеспособностью, со слабым костяком, с плохими формами телосложения и с плохим качеством мяса.

Относительно метизации карачаевских овец с линкольнами говорить уверенно о целесообразности на основе недостаточного проверенного опыта не следует, но нужно сказать, что все предварительно изложенные доводы говорят за то, что метизация карачаевских овец с линкольнскими баранами пойдет при культурных



Группа Карачаевских овец

условиях содержания по пути увеличения качества мясности и количества шерсти, но в ущерб жировому отложению на хвосте. При этом нужно отметить, что линкольнские бараны не весьма охотно кроют карачаевских жирнохвостых маток.

Необходима скорейшая реконструкция овцеводства Карачая путем организации

крупного обобщественного производства.

Мы должны взять решительную линию на создание крупного овцеводческого хозяйства в колхозах Карачая.

Агроном-зоотехн. Рябчиков



Выставка Кучугуровской племовчарни

(К ст. «Достижения Кучугуровской племовчарни» стр. 42).