

Опыт лучших — в массы

Невероятно тяжелая зимовка текущего года с недостаточным запасом сена при отарах, в окружении эпизоотий оспы и чесотки закончилась большевистской победой: 1,5⁰/₀ отхода к общему поголовью за три месяца зимовки, 64 тыс. тонкорунных овец совхоза свободны от оспы и чесотки.

Победа эта была обусловлена героической повседневной работой чабанских бригад, кормивших отару кущанками по 100—150 голов в самый невероятный шурган, валивший с ног человека, и большевистской твердостью и гибкостью администрации, сумевшей поднять и правильно использовать энтузиазм чабанского состава. В начале шургана при первых тревожных признаках недостатка сена все силы были направлены на переброску его к отарам. А затем, как только явилась возможность (утих немного шурган), вместо подвозки сена к овцам, овцы были перебросены к корму. К сараям с достаточным запасом корма было брошено по 4—5 отар, и здесь, под открытым небом, без баз, заканчивали зимовку. А транспорт был направлен в это время на переброску корма и подстилки к маточным окотным сараям.

Начало окота ожидалось 8 апреля. К 15 марта был составлен календарный план проведения кампании. План был



Бригада Горлова, давшая высший процент выхода ягнят во время окота — 135⁰/₀

обсужден и утвержден чабанской конференцией. На этой конференции племрассадник совхоза обязался дать 115⁰/₀ ягнят к случайным маткам и вызвал польза-вательное стадо дать 105⁰/₀. Вызов был принят. Все отары заключили договоры по соцсоревнованию. Чабанская конференция объявила весь штат чабанов мобилизованным на время окота и отказалась от использования выходных дней в этот период. Так была подготовлена общественность совхоза.

К 17 марта была закончена очистка и дезинфекция сараев. К 20 закончена разбивка маточных отар. Каждая отара пришла в чистый продезинфицированный сарай со свежей подстилкой, обеспеченный уже всем необходимым инвентарем.

В дальнейшем был сделан упор на следующие основные моменты техники окота: 1) правильное использование площади сарая, что должно было обеспечить устранение всякой возможности спутывания сакманов, устранение тесноты в оцарках, что особенно важно для младших сакманов, и распределение оцарок по площади сарая наиболее удобно для работы и выгона на пастбище сакманов; 2) правильный распорядок дня чабан-



Чабан пл. манных маток Онищенко дал 143⁰/₀ выхода ягнят к маткам



Очистка стен племовчарни от снега весной

ской бригады, распределение функций между составом бригады и четкое, аккуратное выполнение каждым своего дела.

Было установлено особо тщательное наблюдение за каждой маткой и ягненком в первые дни после окота.

У маломолочных маток двойни метились и подкармливались или коровьим молоком или под более молочной маткой — с одиночком. У безмолочных маток ягнята подпускались под других маток или искусственно выпаивались коровьим молоком. Подкормка ягнят проводилась исключительно под стоящими матками, так как иначе ягнята разучиваются самостоятельно находить соски при нор-



Ремонт сарая, разрушенного шурганом (12 пар стропил были сломаны нанесенным на крышу снегом)

мальном положении матки. Повалка матки допускалась только для самых слабых ягнят.

Техника выпойки ягнят коровьим молоком в совхозе была принята следующая: вначале практиковалась выпойка сырым коровьим молоком, подогретым до температуры тела, но это зачастую вызывало понос. Перешли на пастеризованное молоко. В условиях совхоза пастеризация проводилась так: вода в ведре подогревалась до 65°, затем в нее опускали бутылки с налитым молоком и надетыми чистыми сосками и держали так 30 минут. Температура воды поддерживалась все время 60—65°. Затем бутылки вынимали, охлаждали их до температуры тела, и молоко давалось ягнентам в первые 7—8 дней по 7—8 раз в день, затем — по 4—5. Опыт показал, что обработанное таким образом молоко дает значительно лучшие результаты. Кипяченое молоко безусловно не пригодно для подкормки ягнят.

Кучками пользовались только в самых крайних случаях, когда матка совершен-



Племовчарня совхоза № 12 Сев.-Кав. края

но отказывалась принять ягненка. В практике совхоза была взята установка на то, чтобы к взрослым маткам применялась кучка не выше 5—10%. Гораздо чаще к ней приходится прибегать при работе с матками-первоокотками. Но как общее правило нужно сказать, что кучка — это крайняя мера приучения матки к ягненку. Она нехороша тем, что матки и ягненок лишены возможности движения, отчего понижается аппетит, уменьшается лактация, лишенный движения ягненок плохо крепнет. В нашей практике вполне достаточно было 20 кучек на отару в 800—900 голов. Взамен этого практиковали связывание ягнят двойней в первые 2—3 дня после окота. Для этого употребляется кол с привязанными к нему двумя концами мягкой плот-



Отара зимой на тырл:

ной бечевки, которой ягнята привязываются возле путового сустава. Длина конца около одного метра; матка остается свободной в оцарке. Ягнята распределяются по площади оцарка так, чтобы две соседние пары не доставали бы друг друга и не перепутывались бы. Место для кормежки маток у яслей ягнятами не занимается. В теплую погоду на пастбище в первые дни ягнята связываются таким же образом, только без кола, матки же остаются свободными. Связывание ягнят дает гораздо лучший результат по сравнению с кучками. Оно хорошо также и тем, что матка приучается одновременно кормить двух ягнят и в дальнейшем, найдя одного ягненка в сакмане, ищет другого.

Профилактические мероприятия играли большую роль во всей работе. Была проведена максимально возможная изоляция маточных сараев. Никто кроме обслуживающего персонала к сараю не допускался. У каждого сарая было поставлено корыто с раствором карболки или креолина для дезинфекции ног. Три раза за период окота была проведена очистка сарая и дезинфекция помещений и инвентаря. Проводилось поголовное смазывание пупков у ягнят. Кучки ежедневно чистились и каждые два-три дня дезинфицировались. Вспышка белого поноса, имевшая место в отаре № 25 племенной

и № 14, своевременно была замечена, удалось локализовать заболевание в одном сакмане, не допуская охватить всю отару. Дезинфекция, строжайшая изоляция больных в сарае и на выпасе позволили победить болезнь. Отход 1—1,5% к поголовью отары, 30—40% к поголовью пораженного поносом сакмана.

Показатели окота. По племяссаднику — 132% к числу окотившихся маток, или 117% к числу слученных. По пользователю стаду — 107% к числу маток, пошедших в окот, или 117% к числу окотившихся маток.

В № 4 журнала «Овцеводство» тов. Д. Белов дает несколько неверных установок в своей статье «Ягнение овец и воспитание ягнят в колхозе». Он говорит, что при отаре необходимы «матковозки для подвозки в овчарню овец с ягнятами и обратно — об'ягнвившихся на пастбище». Верно, что необходима матковозка для доставки из грасса в сарай об'ягнвившихся на пастбище маток. Что же касается вывозки маток с ягнятами из сарая на пастбище, это дело совершенно ненужное.

Окотившиеся матки должны быть обеспечены выпасом возле сарая. Ни в коем случае не рекомендуем пользоваться советом тов. Белова — по два, три дня каждую окотившуюся матку выдерживать в кучке — это мероприятие значительно повысит процент отхода ягнят и маток. Метод подкормки 5 ягнят под маткой с повалкой матки также не рекомендуем. Он может применяться только в виде исключения для особенно слабых и больных ягнят.

Все описанные нами методы проверены опытом и оправдали себя. Поэтому считаем своим долгом передать их в другие овцеводческие хозяйства и этим помочь им в борьбе за рост поголовья, за выполнение пятилетки овцеводства.

Зоотехники Рыжов и Филианский

Совхоз № 12 «Большевик»