

ками и постройками следует принять меры к тому, чтобы бараны после случки были отделены от маток и находились в специально отведенном для них помещении. Если бараны разбиты на случку мелкими партиями, их после случки следует собирать в крупные стада; это значительно облегчит уход за ними и даст возможность поставить лучшее наблюдение за их содержанием, кормлением и лечением.

Случкой период растягивать не следует, а проводить его дней в 40, причем в стадах, в которых применяется ручная случка и бараны недостаточно проведены, последние дней 10 их целесообразно использовать путем вольной случки (если матки не жирнохвостые) для докрытия неудачно покрытых маток или пропущенных при ручной случке.

Несомненно, что в деле метизации овец особое внимание должно быть уделено сохранению и выращиванию молодняка. Чрезмерно большой отход яг-

нят до отбивки от маток и в особенности в период окота ставит задачу всемерного упорядочения зимнего содержания маток, покрытых мериносами, и лучшую организацию окота. Если предполагается проведение зимнего окота, надо заранее утеплить овчарни.

Искусственное осеменение играет большую роль в деле метизации овец, но несмотря на всю важность, этому вопросу до сих пор не уделяется должного внимания. Результаты работы 1930 г. по искусственному осеменению дают самую пеструю картину. Процент яловости маток по отдельным совхозам колеблется от 6 до 55.

Здесь также следует отметить слабую организационную постановку этого важнейшего мероприятия. Необходимо принять все меры к тому, чтобы в этом году на этих важнейших работах в области овцеводства были сосредоточены все силы.

Дейхман

Случка мериносовых ярок в полуторагодичном возрасте

Спуск полуторагодичных ярок мериносовой породы — дело не новое. Еще в довоенное время овцеводы Кубани, Северного Кавказа и Ставрополя для скорейшего увеличения своих стад прибегали к случке полуторагодовых ярок. Климатические и почвенные условия вполне этому благоприятствовали. Хорошо содержимые ярки к 1½ годам развивались достаточно и приносили здоровых, хорошо развитых ягнят. В остальных частях юга, где господствовало влияние немецких бонитеров, спуск мериносовых ярок производился всегда в возрасте 2½ лет. В последнее время, когда у нас из 4,5 млн. мериносовых овец осталось едва 350 тыс. над вопросом спуска ярок в более раннем возрасте пришлось серьезно задуматься. В моей практике на Кубани мне приходилось проводить случку ярок в полуторагодичном возрасте в совхозах, предварительно выбрав из стада 50% наиболее крупных и лучше развитых. За недостатком взрослых баранов отобранные ярочки были покрыты лучшими

полуторагодовальными баранчиками. Спуск прошел хорошо; в течение 40 дней бараны покрыли ярочек и охотниц больше не оказывалось. Для того чтобы проследить в дальнейшем за ходом развития покрытых ярок и результатами окота, ярки все время с зимы до самой осени содержались в отдельных от маток отарах, подкармливались всю зиму лучшим сеном, и для них были отведены лучшие помещения. В течение зимы выяснилось, что эти ярки развиваются ничуть не хуже, чем их сверстницы, оставшиеся непокрытыми.

Окот показал, что яловых оказалось несколько больше нормального числа.

Новорожденные ягната от полуторагодичных овец по весу несколько уступают рожденным от взрослых маток, но вполне жизнеспособны. Двойни рождаются очень редко.

Ярочки, как все первороженцы, нередко отказывались от своих ягнят, и их приходилось сажать вместе с ягнятами в кучки (клетки). Клеток понадобилось вдвое больше, чем для старых

маток. В первое время молока у ярок было мало, поэтому на подкорм ягнят под яркими обращалось особое внимание. Однако в скором времени молока добавилось, и кормление ягнят шло вполне удовлетворительно.

Подкорм концентрированными кормами за недостатком их в течение лета не производился. Ко времени отбивки ягнят по своему росту и упитанности ничуть не уступали ягнятам, полученным от взрослых маток. Но ярки, кормившие ягнят, были в худшем состоянии, чем взрослые матки. После отбивки ягнят, ярок пришлось поставить на хорошие жнивья, где они чрезвычайно быстро начали поправляться и к началу спуска оказались в хорошем состоянии.

Сравнение ярок об'ягнившихся с не бывшими в спуску показало, что первые оказались все же лучше развитыми, какими они и были при отбивке перед спуском.

На следующий год былипущены все полуторагодовые ярки, за исключением 10—15% более слабых и недоразвитых, оставленных на спуск в полуторагодичном возрасте. Содержание ярок в течение зимы было улучшенным. Разницы в окоте и кормлении ягнят также нельзя было заметить по сравнению с предыдущим годом. Покрыты были ярки баранчиками полуторагодичного вораста. Несколько старых баранов,пущенных с полуторагодовыми, оказались слишком тяжелы, поэтому в следующие годы продолжали все время крьть ярок полуторагодовыми баранчиками.

Основные правила, которые можно соблюдать при пуске ярок в полуторагодичном возрасте, это: 1) хорошее кормление ярок до спуска и все время до достижения ими 2½ лет (период окончания главного роста мериносов), 2) следить за тем, чтобы на ярках не было чесотки, чрезвычайно вредно отзывающейся на росте как самих ярок, так и молодняка, и 3) содержать ярок отдельно от взрослых маток, так как

в смешанном стаде не возможно кормить одну часть лучше другой.

Уход за яркими при окоте более труден, чем за взрослыми матками. К окоту яроты нужно назначать лучших чабанов-окотчиков. Проводить окот яроты следует отдельно от взрослых. Некоторые возражают против этого, ссылаясь на то, что при окоте яроты отдельно трудно подсадить ягненка от безмолочной ярки к более молочной взрослой. Но как уже сказано, маломолочность ярок продолжается недолго — 1—2 дня, а затем молоко прибывает, и ярки могут кормить своих ягнят. Ярок с порченым выменем почти не попадается. Двойней ярки дают мало. Главное — это приучение перворожениц к присмотру за ягнятами и кормлению их. Если кучек (клеток) запасено достаточно, то всю яроту следует пропустить через клетки и пускать в кущанки только принявших и кормящих ягнят ярок.

Если при стаде мериносов содержатся кормилицы — грубошерстные матки, то к яркам нужно дать больше кормилиц.

В целях быстрейшего увеличения тонкорунного овцеводства правление Овцеводчестра уже дало распоряжение своим совхозам с осени 1931 г. приступить к случке мериносовых ярок от местных мериносов рамбулье и южноамериканских маток в полуторагодичном возрасте вместо обычно применявшейся первой их случки в 2½ года. Прежние сроки первого спуска оставлены только для племенных стад и австралийских камвольных овец, привезенных к нам в 1929 и 1930 гг. в относительно небольших количествах и еще изучаемых.

Из всех мер, применяемых для скрещивания поголовья, пуск ярок в полуторагодичном возрасте без сомнения даст наилучший эффект, поэтому нужно всячески поддерживать это мероприятие и распространить его за пределы совхозов.

Я. Слодкевич

Ликвидировать обезличину, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии — такова задача

(Из речи И. Ставина на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г.)