

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДНЯКА

Больше заботы о молодняке

Вопросы сохранения и выращивания молодняка несомненно являются основными в наших мероприятиях по увеличению овчего поголовья.

Без правильного разрешения этих вопросов мы не разрешим животноводческую проблему — одну из важнейших проблем нашего социалистического строительства.

И конечно не случайно Наркомзем ССР созвал специальное совещание, посвященное вопросам сохранения и выращивания молодняка.

Это совещание с достаточной полнотой показало, что в наших совхозах колхозах молодняк еще не окруженной заботой и вниманием, которые являются необходимым и основным звеном в наших мероприятиях по разрешению животноводческой проблемы.

Забота о молодняке должна начаться уже в момент случки. Соответствующее кормление барана перед случной кампанией является необходимым условием для получения здорового потомства. Таким

же условием является повышенное кормление суягных и подссыпных маток.

Между тем этим моментам ни в совхозах, ни в колхозах до сих пор не уделяется достаточного внимания.

Серьезное значение имеют вопросы тщательного охранения новорожденных ягнят в первые же дни и часы их рождения. Закутывание в овчины, устройство соответствующих помещений для окота — необходимые условия уменьшения отхода молодняка.

Другой вопрос, который должен быть разрешен на местах, это вопрос о подкормке двоен и троен (коровьим молоком или путем мамок и введения в кормовой рацион соевого пойла).

Все эти элементарные вопросы сохранения и выращивания молодняка должны быть тщательно проработаны на местах.

Забота о молодняке, борьба с гадежом должны стать одной из боевых задач овцеводческих колхозов и колхозных ферм.

Л. Ф. СМИРНОВ

Воспитание ягнят романовской породы

Первые дни после окота ягнится пользуются исключительно материнским молоком, называемым молозивом. В это время молоко имеет особое послабляющее свойство, которое, действуя на пищеварительный тракт ягнят, способствует извлечению кишечника от слизи, или так называемого первородного кала.

Молозиво для родившихся ягнят является незаменимым кормом, и лишать ягнят материнского молока ни в коем случае не следует. Давно установлено, что ягната, воспитанные на од-

ном коровьем молоке, первые две недели развиваются гораздо слабее ягнят, воспитанных под маткой. Кроме того ягната, не получившие молозива, трудно освобождаются от кала, вследствие чего происходят запоры.

Обычно одинцы и двойники до трехмесячного возраста пользуются исключительно материнским молоком. Для нормального развития одиц и двойников этого молока у романовской овцы вполне достаточно. Если у матки испортилось вымя или потерялось молоко, один-

цы и двойники берутся на подвойку, но это бывает редко. В большинстве же случаев матки не старые и не первого окота воспитывают двойников вполне нормально.

Тройники и четверники при правильном кормлении требуют обязательной подвойки коровьим молоком. Время взятия ягнят на подвойку зависит от молочности матки и от количества ягнят в приплоде. Чем молочнее матка, тем меньше ягнят в приплоде, тем дольше хватает молока ягнятам и наоборот. Необходимо ягнят переводить на подвойку во время, так как ягната, взятые на подвойку с опозданием, трудно привыкают к коровьему молоку и медленно поправляются. Обычно тройники нормального веса берутся на подвойку на 8-й день после рождения. Тройников у ярок, четверников у маток и ягнят с малым живым весом при рождении начинают подпаивать в первые дни после окота.

О недостатке молока у матки можно судить по слабому развитию ягнят, а также по состоянию самой матки. Если у матки нехватает молока, она становится беспокойной, бегает, отталкивает ягнят и не дает им сосать. У старых маток, а также у ярок иногда нехватает молока и для двойников, в таком случае ягнят также немедленно берут на подвойку.

Подвойка коровьим молоком производится из бутылок с надетыми на горлышко сосками. Некоторые ягната привыкают пить молоко прямо из деревянных чашек. Молоко должно быть цельное, ничем не разбавленное, теплое, лучше всего парное, но если такого нельзя иметь, то следует холодное молоко подогревать до температуры парного (27°) и только после этого давать ягнятам. Посуда, в которой подогревается молоко, обязательно должна быть чистая, хорошо промытая теплой водой, — иначе молоко может скиснуть. Ни в коем случае не следует давать ягнятам холодное, кислое или загрязненное молоко, иначе у ягнят появляется понос и разного рода заболевания. Ягната к подвойке коровьим молоком из бутылок привыкают очень быстро. В том же случае, когда ягненок не хочет брать соску, берут его на колени, насиливо раскрывают рот, вставляют соску и заставляют ягненка жевать. После двух-трех раз ягната привыкают к соске и начинают пить молоко.

Первые три-четыре дня ягнят, особенно слабых, следует подпаивать коровьим молоком в сутки раз шесть — в 6 и 9 часов утра, в 12 часов дня, в 3 часа пополудни, в 6 и 9 часов вечера. К концу недели переходят на пятикратное кормление молоком. Затем постепенно переходит на четырех- и трехкратное кормление.

При трехкратном кормлении ягнят подпаивают в 6 часов утра, в 12 часов дня и в 6 часов вечера. Подвойка коровьим молоком продолжается до трехмесячного возраста. В трехмесячном возрасте ягнят отсаживают от маток. Остаются под маткой лишь те ягната, которые имеют слабое развитие. При начале подвойки не следует давать ягнятам много молока, так как от этого происходит понос, с которым трудно бороться.

Для воспитания ягнят по норме на одном коровьем молоке без материнского до трехмесячного возраста требуется молока в среднем 97—99 кг. Данное количество молока является лишь показателем нормы, необходимой для правильного развития ягнят. В том же случае, когда ягната пьют коровье молоко без всякой нормы — сколько хотят, количество молока на каждого ягненка значительно увеличивается. Так по данным Северной зональной опытной станции по овцеводству, при кормлении ягнят молоком вволю до трехмесячного возраста требуется 178—191 кг. коровьего молока. Наибольшее количество молока в сутки выпивалось ягнятами во вторую неделю опыта — 2,98 кг. на каждого ягненка. При таком кормлении ягната имели к трехмесячному возрасту вес в 24—26 кг. Указанные цифры являются ориентировочными. Таким образом правильная выпойка ягнят на одном коровьем молоке дает возможность воспитать вполне нормальных племенных животных.

На Северной зональной опытной станции ежегодно воспитывается на одном коровьем молоке по несколько ягнят, и каждый год из числа их известная часть попадает в элитную группу и оставляется на племя. Количество коровьего молока, потребного для воспитания ягнят-тройников под маткой, в значительной степени колеблется от молочности маток. Чем молочнее матки, тем меньше требуется коровьего молока на выпойку ягнят. При расчете на большое стадо необходимо иметь коровьего молока на

каждого родившегося тройника не менее 64 кг. Иногда при отсутствии коровьего молока тройников воспитывают исключительно под маткой. В таком случае рекомендуется ягнят отсаживать от матки и подпускать их для кормления под матку -попеременно, причем ягнят более слабых следует подпускать в первую очередь. При таком кормлении слабые ягната догоняют в развитии более крепких. В результате приплод получается ровный по развитию.

Кроме молока ягната требуют грубых и концентрированных кормов. Если ягната воспитываются под маткой, они пользуются сеном и концентрированным кормом вместе с маткой. Беря пример с матери, они с двухнедельного возраста начинают щипат сено и лизать отруби. Ягната, отсаженные от матки, значительно позднее привыкают к грубому и концентрированному корму. С трехмесячного возраста ягнят отнимают от матки, прекращают подкормку коровьим молоком и сажают на особый рацион: 200 г льняного жмыха и 300 г овсянки. Жмых следует задавать дробленый в сухом виде, овсянку — в виде болтушки, сена вволю. С момента выгона ягнят на пастбище рацион изменяется.

Ягната, выгнанные на пастбище в возрасте 1½—2 месяцев, значительно хуже

переносят переход от зимнего кормления к зеленому корму. Обычно первые две недели вес всего стада сильно падает. Поэтому следует в это время уделить максимум внимания уходу и содержанию молодняка. Переход от зимнего кормления к летнему должен быть постепенный. Первые дни ягната пасутся несколько часов, затем срок удлиняется, а к концу недели уже можно перейти на нормальную пастбищу. В помещении, куда загоняется молодняк, необходимо иметь первые дни сено, чтобы ягната могли по мере надобности им пользоваться. Кроме этого ягнят в течение всего лета надо подкармливать концентрированным кормом. Особенно это важно для баранчиков, которые в силу своей половой погенции без подкормки концентрированным кормом в летнее время сильно истощаются и к моменту осенней бонитировки имеют вид недоразвитых животных. В среднем в летнее время на каждого баранчика в сутки полагается смеси отрубей, овса и жмыха — 0,4 кг и на каждую ярочку 0,2 кг. Такое кормление продолжается до загона молодняка на стойловое содержание. Вообще при воспитании молодняка надо помнить, что только хороший уход и обильное кормление могут обеспечить нормальное развитие животных.

В. И. СЕМЕНОВ

Развитие овец разных пород до годового возраста

Знакомство с порядком развития ягнят имеет большое значение для овцеводческого хозяйства.

Ягната развиваются очень энергично в условиях нормального кормления и содержания. Особенno интенсивно развиваются скропспелые английские мясные овцы. Ягната достигают 90% живого веса матери в возрасте 7—8 месяцев в состоянии средней упитанности. Суточный привес в возрасте 7—9 месяцев не одинаковый, по отдельным английским породам колеблется в пределах от 230 до 330 г на голову. У животных более старшего возраста, однако не достигших двух лет, суточный привес значительно меньше, он колеблется в преде-

лах от 140 до 230 г. Наблюдения над овцами курдючной породы, проведенные Темирской опытной станцией, показали, что ягненок до 3 месяцев имеет средний суточный привес несколько выше 300 г, в последующее время наблюдается уменьшение суточного привеса.

Ягната с датой рождения в промежуток между 20 апреля и 20 мая давали средний суточный привес к началу сентября, равный 275 г. Отмечается, что у отдельных ягнят в период пастбищного содержания суточный привес колебался в пределах от 250 до 500 г по отдельным месяцам. В отношении курдючных ягнят виду высокой молочности маток приходится отметить, что