

Племенное дело

П. ШАХВОРОСТОВ

Бонитировка овец — важнейший участок племенной работы в овцесовхозах

В годы 1930—1932, в период широко развернутой работы по строительству овцеводческих совхозов, главный упор был взят на размещение поголовья, принятого в порядке комплектования, на создание необходимой хозяйственной обстановки для овец (помещения, корма, водопой). Такая организационная работа, тем более в условиях трудностей форсированного роста числа совхозов и поголовья овец в них, отнимала все внимание руководства. Вопросам глубокой, планомерно организованной племенной работы ни совхозы, ни тресты не уделяли необходимого внимания. Вопросы бонитировки стада, подбора баранов-производителей как для целей метизации с грубощерстными матками, так и для чистого разведения разрешались поверхности, от случая к случаю. Ответственнейшая по своему значению племенная работа была предоставлена самотеку, крупнейшие вопросы в этой части разрешались в совхозах малоквалифицированными работниками, а иногда даже чабанами. Но и по окончании реорганизационного периода руководство совхозов и трестов продолжало расценивать мероприятия по организации племенной работы, как второстепенные, не уделяя им необходимого внимания.

Теперь по окончании организационного периода, когда перед каждым овцеводческим хозяйством стоят задачи организационно-хозяйственного укрепления, повышения продуктивности стада и увеличения сдачи продукции государству, основой для оценки работы хозяйств являются качественные показатели. Повышение как мясной, так и шерстной производительности овцеводства при хорошей хозяйственной обстановке может быть достигнуто только в том случае, если хозяйство обеспечит систематический

ежегодный отбор на племя только лучших в племенном отношении животных, которые могли бы передать свои ценные качества наибольшему количеству приплода. В крупном овцеводческом хозяйстве к числу главнейших элементов правильно поставленной племенной работы относится прежде всего ежегодная бонитировка стада, которая как правило в отношении тонкорунных и полугрубощерстных овец должна производиться весной перед стрижкой.

Если мелкое единоличное крестьянское овцеводство не могло использовать достижения зоотехнической науки в области организации племенной работы, то наши ювцеводческие хозяйства — совхозы и ОТФ — имеют для этого все возможности как в силу большого качественного разнообразия поголовья (наличие высококлассных племенных животных в стаде), так и вследствие обеспечения проведения этой работы квалифицированными кадрами специалистов.

Помещичьи овцеводческие хозяйства прекрасно учитывали всю важность правильной организации племенной работы и бонитировки и не останавливались даже перед необходимостью крупных затрат и приглашения опытных специалистов- бониторов из-за границы. Эффективность этих мероприятий в виде увеличения продуктивности стада и повышения его племенной ценности не вызывала у кого никаких сомнений.

В 1933 г. СНК СССР по докладу о состоянии поголовья в ювцевосхозах обязал Наркомсвхозов, начиная с осени 1933 г., ввести обязательную ежегодную бонитировку овец. Проведение этого мероприятия необходимо для закрепления положительных результатов метизации и для систематического повышения племенных качеств овец.

Осенью прошлого года в ювцевосхозах бонитировкой было охвачено свыше 300 тыс. гол. овец. Но при четырех миллионном поголовье бонитировка 300 тыс. голов овец является только маленькой частицей, маленьким началом огромной

работы по бонитировке. Вот ряд примеров из практики совхозов.

Украинский овцеводтрест должен был охватить бонитировкой около 120 тыс. овец в 8 совхозах. Однако пробонитированы только 59 тыс. гол. в 5 совхозах, стадо трех совхозов осталось непробонитированным. Украинские совхозы — сравнительно старые хозяйства — организационно больше укреплены, лучше обеспечены кадрами и т. д. Может быть общее состояние совхозов и порядок в отарах овец дают возможность директору Украинского овцеводтреста т. Колеснику спокойно смотреть на будущее? Материалы, подписанные самим т. Колесником, говорят об обратном. Оказывается, Украинский овцеводтрест до осени 1933 г. не знал фактического породного состава стада в ряде своих совхозов. В совхозе им. Р. Люксембург в течение ряда лет стадо овец считалось чистопородным цыгайским, и ни у кого этот вопрос никаких сомнений не вызывал. При бонитировке же оказалось, что из 17 833 голов маток — 1 424 гол. метисов цыгай + грубошерстных. В отаре № 16 атагаса т. Гарбуза из 1 254 гол. маток метисов оказалось 345 гол., в отаре № 17 атагаса т. Чернявского на 1 139 гол. маток метисов было 387 гол. Лучшие по качеству 3 287 маток оказались распыленными в 14 разных отарах. В то же время Украинский овцеводтрест, имея в аппарате специалиста-бонитера, мог своевременно привести в порядок стадо. Но этому помешало недопустимое отношение руководства треста и совхозов к развертыванию племенной работы и полная недооценка всей важности этого мероприятия.

Североказахстанский овцеводтрест (директор Цветков, зоотехник Кинчиков) и совхозы, входящие в его состав, до сих пор не могут разобраться в породном составе поголовья. Отчеты этого треста по случке, по окоту, по от'ему ягнят от маток с исчерпывающей полнотой характеризуют неразбериху в стаде.

В других совхозах и трестах с бонитировкой стада дело обстоит не лучше. Из 180 совхозов можно назвать только отдельные единицы, удовлетворительно справляющиеся с этими задачами.

Такому недопустимо безобразному отношению совхозов и трестов к вопросам организации племенной работы и важнейшего элемента этой работы — бонитировки — должен быть самым решительным образом положен конец. Весна

текущего года может и должна стать переломной в деле борьбы за качественное улучшение, за повышение племенно-ценности стада. Бонитировку нельзя производить в любой период года. Только весною, когда животные имеют полную шерсть (тонкорунные и полугрубые) можно сделать безошибочную оценку шерстных качеств. Пропустить этот момент значит упустить целый год. Поэтому племенная работа и бонитировка должны быть развернуты именно весной.

Бонитировки обязательно должны быть подвергнуты все овцы, достигшие к весне годового возраста. Надо прямо сказать, что всякие теории о необходимости бонитировки только племенного или тонкорунного стада и о бесполезности бонитировки промышленного стада, в особенности грубошерстных маток, метизируемых с тонкорунными баранами, не только глубоко ошибочны, но и сугубо вредны.

Практика десятков совхозов при проведении метизации показала, что там, где бонитировке стада и основанныму на ней подбору маток и баранов к случке не уделяется нужного внимания, там недопустимо низки качественные показатели метизации как в отношении настрига шерсти, так и в отношении мясности. Широко распространенное использование для метизации малопродуктивных баранов, полное отсутствие данных об индивидуальной продуктивности баранов, случайное распределение их по маточным отарам — вот те основные причины, которые снижают эффективность метизации, вызывают огромные потери в продуктивности стада и понижают рентабельность совхозов.

Каждое овцеводческое хозяйство на весну текущего года должно поставить перед собой в качестве основной задачи:

1) охватить бонитировкой максимальное количество непробонитированных еще овец, в первую очередь тонкорунных и полугрубошерстных;

2) подвергнуть обязательной индивидуальной бонитировке всех без исключения баранов-производителей, используемых в случке, как для чистого разведения, так и для метизации;

3) в предстоящую весеннюю стрижку во что бы то ни стало путем взвешивания определить живой вес каждого барана, индивидуальный настриг шерсти с него и длину шерсти в шапеле; то же в отношении маток элитного стада;

4) путем выборочного взвешивания не менее 10% овец в каждой отаре опреде-

литы средний живой вес и настриг шерсти у овец различных породных, возрастных и половых категорий.

Охват поголовья бонитировкой во многом будет зависеть от наличия достаточно квалифицированных кадров. Это — узкое место сейчас, когда приходится наверстывать упущенное за ряд лет. Но возможности в этой части есть огромные, нужно только полностью использовать наличных зоотехников-бонитеров и создать им в хозяйствах юбстановку, обеспечивающую максимальную производительность труда, исключив простой из-за несвоевременной подачи овец, транспортных средств, рабочей силы и прочих неполадок. СНК СССР в своем решении от 9/VIII 1933 г., учитывая недостаток кадров зоотехников-овцеводов, обязал все организации, имеющие в своих аппаратах бонитеров, освобождать их на 2—3 мес. в году для работы по бонитировке в овцеводческих совхозах.

В текущем году Главными управлениями овцеводческих и племхозов разработана и выпускается на места единная инструкция по бонитировке овец и организации племенного дела. В отличие от директив прошлых лет в инструкции текущего года подробно разработаны все основные специальные и организационные элементы бонитировки и племенного дела. Так как оценка племенных достоинств овец во многом субъективна, во многом зависит от подхода к этим вопросам бонитера, нужно потребовать от всех работников, проводящих бонитировку, что-бы оценка овец производилась в строгом соответствии с принципами установленными наркоматом совхозов. Только при таком принципиальном единстве можно действительно правильно организовать племенную работу во всех овцеводческих совхозах и на основе отбора лучшего подлинно племенного материала, на основе перераспределения его между совхозами.

снабжая высококлассным племенным материалом нуждающиеся совхозы в кратчайший срок обеспечить качественное совершенствование стада в тех размерах, которые нужны при существующем объеме производства совхозов.

Стадо большинства овцеводческих совхозов запущено не только в отношении бонитировки; многие совхозы не знают состава метисного стада по генерациям. Знание степени кровности метисов представляет огромный интерес для правильной организации подбора, для определения в случае необходимости предела метизации, после которого метисы должны будут разводиться в чистоте. При бонитировке следовательно нужно также определить генерацию метисов, если она неизвестна. Но наиболее правильным будет определение степени кровности (генерации) метисов во время окота по маткам. В это же время следует производить необходимые отметки на ушах.

Сезон весенней стрижки должен быть полностью использован для установления индивидуальной продуктивности животных по настригу шерсти, по живому весу и по длине шерсти баранов-производителей и маток элитного стада. Эти данные абсолютно необходимы для руководства при подборе маток и баранов осенью для случки. Не имея этих данных, нельзя правильно организовать племенную работу. Каждый руководитель овцеводческого хозяйства, будь то директор или зоотехник, должны наконец осознать, что без углубленной племенной работы стадо такого совхоза с каждым годом будет не улучшаться, а деградировать. Вывод из этого нужно сделать только один: все мероприятия по бонитировке стада и всю зоотехническую работу надо включить в разряд важнейших производственных задач и во что бы то ни стало добиваться полного их выполнения.

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! РАБОТАЙТЕ В КОЛХОЗЕ ЧЕСТНО И БЕРЕГИТЕ КОЛХОЗНОЕ ДОБРО,— В ЭТОМ ПУТЬ К ЗАЖИТОЧНОЙ ЖИЗНИ!

Из первомайских лозунгов ЦК ВКП (б)