



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТОФЕЛЬ В СВИНОВОДСТВЕ

Известно, что картофель является превосходным кормом для скота. Его ценность видна из следующей диаграммы, представляющей соотношение питательных веществ в различных кормах:

Название корма	Сухое вещество	Переваримый белок	Количество кормовых единиц в 1 кг корма
	В процентах		
Картофель . . .	25	0,9	0,31
Турнепс	12	0,1	0,07
Ячмень	85	6,1	1,20
Пшеница	86	9,0	1,19

Таким образом картофель беден белком, но питательная ценность его высока. Мы видим, что 4 кг картофеля соответствуют приблизительно 1 кг ячменя или пшеницы. Но в то же время 1 кг картофеля соответствует 2,5—3 кг турнепса. Это сравнение нельзя распространять на все породы скота, так как ценность картофеля для них весьма различна.

Однако в хорошем действии картофеля как корма для свиней сомневаться не приходится. При откорме свиней ценность 1 кг картофеля выше ценности 3 кг турнепса при условии, что картофель дается парной или вареный. Сырой картофель является плохим кормом для свиней, так как он плохо переваривается, и поэтому значительная часть его питательной ценности теряется. Если кормить свинью одним и тем же количеством сырого и парного картофеля, то при сыром картофеле нельзя достигнуть и половины того прироста в весе, который получится при даче парного картофеля. Поэтому надо взять за правило никогда не давать откармливаемым свиньям сырого картофеля, так как это связано с напрасной тратой корма и не приносит никакого успеха. В крайнем случае нужно давать сырой картофель старым, откормленным, уже изношенным свиньям, совершенно не давая его подсосным маткам и поросятам. Этим последним даже не следует давать слишком много вареного картофеля, так как картофель является продуктом для откармливания животных, а молодые поросята должны расти крепкими, но не жирными.

Картофель содержит мало белка, и поэтому при даче картофеля необходимо добавлять в рацион богатый белком корм. Кроме того из опытов установлено, что наилучший прирост в весе происходит, если к картофелю и добавочному белковому корму прибавлять немного дерти. Дерь может быть ржаной, пшеничной, ячменной и овсяной. Лучше всего, если во время откорма придерживаться следующей ежедневной нормы для каждой свиньи: 1 кг зерна, 4 л снятого молока, а остальное — пареный картофель.

При таком питании достигается превосходный рост животных в весе. Племенным свиньям не следует давать много картофеля, так как они от него становятся слишком жирными, и это плохо отражается на их производительной способности. Однако племенные свиньи могут получать без вреда столько картофеля, чтобы они оставались полусытыми.

Необходимо отметить, что картофель даже в небольших количествах содержит ядовитое вещество — «соланин». При парке и варке картофеля соланин переходит в воду. Поэтому вода, оставшаяся от варки картофеля, не должна даваться свиньям.

Х. ЛЮТГЕ (ГАЛЛЕ)