

КАК СКАРМЛИВАТЬ СВИНЬЯМ

СИЛОСОВАННЫЙ КОРМ

Силосованный корм из растений, богатых белками (кукуруза, сорго, подсолнух и т. п.), созревает для скармливания через 1—1½ месяца, а из растений, богатых белками (соя, люцерна, клевер, вика и др.), — через 2—2½ месяца после закладки. Готовый силосованный корм должен сохранять строение и цвет засилосованной массы и обладать приятным запахом свежеспеченного черного хлеба (горячий силос) или сладковатым запахом свежих плодов (холодный силос).

Опыты наших и зарубежных хозяйств показывают, что промерзший силос может быть без вреда скармлен скоту, но корм этот нужно обязательно перед скармливанием оттаять.

Промерзший и оттаявший силос очень скоро портится; поэтому скармливать следует тотчас же после оттаивания. Вообще зимой надо скармливать силос в утепленном свинарнике или скотном дворе, чтобы он не замерз, пока животные съедят его. С наступлением тепла промерзший и оттаявший силосованный корм быстро портится и сохраняется дольше не может.

Силосованный корм скармливается непосредственно после его выемки из башни или ямы. При хранении на воздухе в течение нескольких часов силосованный корм плесневеет, портится и становится негодным для употребления. Поэтому, если корм несколько задержался на воздухе, надо перед скармливанием его животным удалить ту часть, которая покрылась налетом плесни.

Поверхность силоса в башне или яме не должна долго оставаться открытой, а каждый раз непосредственно после выемки корма закрываться слоем соломенной резки, половы (мякины) или верхним слоем корма.

Для использования корма из башен или ям он снимается каждый раз ровным нетолстым слоем от 5 до 10 см. Поперечник башни или ямы должен быть рассчитан, чтобы такой слой корма соответствовал потребности хозяйства по числу голов скота на разовую дачу силоса.

Если корм задается в 2 приема, слой силоса для разовой дачи должен быть вдвое тоньше — от 2,5 до 5 см.

Взрослым свиньям нужно скармливать только очень хороший силос в количестве 1,5—2,5 кг на голову в сутки. Больше всего для свиней пригоден силос, приготовленный из плодов тыквы. Не плох также картофельный силос.

Плесневелый или перебродивший силос свиньям скармливать нельзя. Силоса из одной картофельной ботвы или из ботвы корнеплодов свиньям скармливать также нельзя.

Супоросным маткам в последние 2—1½ месяца перед опоросом никакого силоса скармливать нельзя.

При скармливании силоса свиньям следует задавать в пищу также мед, молотый известняк или печную золу из расчета 5—15 г на голову.

При кормлении животных по нормам надо знать питательность силоса в кормовых единицах. Питательность силоса зависит от того, какие растения и какой степени зрелости были засилосованы.

Питательность силоса из разных растений можно приблизительно выразить в таких цифрах (количество килограммов кормовых единиц в килограмме силоса): 1 кг силоса кукурузы с початками — 0,20—0,25 кг кормовых единиц, в 1 кг силоса из кукурузы без початков — из 0,15—0,17 кг кормовых единиц, в силосе подсолнуха — 0,14—0,17 кг, из сорго — 0,14—0,17 кг, из клевера — 0,14—0,16 кг, из ботвы кормовой свеклы — 0,13 кг, из люцерны — 0,12 кг, из тыквы 0,10—0,11 кг, из зеленой ржи — 0,09—0,10 кг кормовых единиц.

Правильное кормление силосованным кормом с соблюдением всех перечисленных выше условий и правил легче и лучше всего может быть проведено в хорошо организованном хозяйстве, при крупных силосных башнях и т. п.

Достигнуть этих условий каждый бедняк или середняк может легко, обобщив своих свиней в крупном свиноводческом колхозе.