



Еврейский с-х. коллектив (Бердичев). Матка ан-глийской породы с поросятами

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МАТКАМИ И ПОРОСЯТАМИ В ОСЕННИЕ ОПОРОСЫ

Для наибольшего увеличения товарной свиной продукции и свиного поголовья за счет собственно саморемонта и расплода свиней на СТКФ необходимо использовать все особенности свињи как главной машины по производству мяса.

Основное преимущество свињи заключается в том, что она поросится два раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний месяцы. Это свойство следует всесторонне использовать. Для этого на протяжении июля и августа надо покрыть всех свиней-маток (кроме подсосных) в возрасте 8 месяцев и старше.

У некоторых свиноматок охота бывает в скрытом состоянии, поэтому рекомендуется групповая случка. Для этого утром, примерно спустя 1—1½ часа после утренней задачи корма, хряк-производитель пускается на дворик с группой свиноматок, предназначенных к покрытию. Эта группа должна находиться под наблюдением свинаря. Покрытых свиноматок из группы необходимо удалять. Осо-

бенно надо следить за тем, чтобы не происходило родственного спаривания, так как это губительно отражается на приплоде.

Свиноматки, покрытые в июле и августе, должны будут пороситься в ноябре-декабре. Поэтому надо приложить все усилия, чтобы сохранить приплод ют падежа. Благоприятные условия (воздух, пастбище, прогулки, прямые солнечные лучи), способствующие в весенне-летний период быстрому росту и развитию поросят, отсутствуют в осенне-зимние месяцы. Задача заключается в том, чтобы эти условия создать и в осенне-зимнее время.

Практика текущего года показала, что на поросятах губительно отражается не только отсутствие хороших кормов, но и сырость, скученность, сквозняки, спертый воздух. Поэтому свинарники должны быть тщательно просушены и провентилированы.

Свинарники, предназначенные для по-

порсящихся маток, нужно достроить не позже I/X этого года. В тех же СТКФ, где маточное отделение недостаточно, необходимо приспособить имеющиеся лучшие помещения для порсящихся маток путем утепления их снаружи обкладкой навозом, а внутри — настилом жердей и сухой соломы. Маточники должны быть обеспечены печами, с соблюдением противопожарных мер.

В холодное время года новорожденных поросят в течение первых 3—5 дней следует держать в ящиках, покрытых мешковиной. Если поросята будут плохо согреваться, то внутри ящика надо ставить бутылки с теплой водой. Из ящиков поросят подсаживают к матери только на время кормления.

Обычно кормовому вопросу не уделяется должного внимания, между тем качество корма сильно влияет на развитие и рост поросят. Зимой взрослых и кормящих свиноматок недостаточно кормить только зерновым кормом. Этот корм очень хорош, но он беден так называемыми белковыми и минеральными веществами.

Суточная кормовая норма кормящих свиноматок должна складываться из концентрированных кормов (куда входят овес, ячмень, отруби, жмых и др.) до 60%, сена бобовых (клевер, люцерна, вика с овсом) — до 10%, сочных кормов (картофель, свекла, морковь и пр.) и 5% корма животного происхождения (мясокостная и рыбная мука, снятое молоко) и сверх нормы до 20% суточной дачи минеральных кормов, примерно на голову взрослой свиньи до 150 граммов (сюда входят мел, известь, жженая кость, соль и др.).

За два-три дня до опороса суточная дача корма свиноматок должна состоять главным образом из отрубей и даваться в виде болтушки. Корм этот дается как послабляющий и охлаждающий.

Свиноматку необходимо поместить в чистом сухом станке с подстилкой. Станки необходимо снабдить перегородками, предохраняющими поросят от задавливания. За порсящимися свиноматками надо установить дежурство опытных свинаярей. По мере рождения поросят обтирают, освобождают рот от слизи, перевязывают пуповину на высоте до 5 см, затем отсаживают в ящики, покрытые мешковиной. Спустя 1½—2 часа после опороса подсаживают всех поросят к матери. При этом надо следить, чтобы

более крупные поросята взяли задние, а мелкие — передние соски. Если поросят родится больше, чем имеется сосков у свиной-матки, то их подсаживают к другой свинье, у которой родилось меньше поросят. Подсадку нужно делать осторожно, предварительно продержав чужих поросят вместе с поросятами другой свиной-матки, чтобы они приобрели общий запах. После опороса свиноматку не пужно кормить в течение 12—24 часов. Ей можно давать только тепловатую воду для утоления жажды.

Спустя сутки после опороса можно давать отруби и дробленый овес в виде болтушки, затем примерно половину суточной дачи давать в течение 3—4 дней. Суточную дачу до нормы надо увеличивать в течение недели.

Вообще увеличивать количество корма кормящим свиноматкам надо постепенно, так как увеличение корма вызывает обильную молочность, что может вызвать понос у поросят. Надо помнить, что кормящую свиноматку нужно питать молокогонными кормами, особенно если мы хотим иметь два опороса в год. Кормить надо с таким расчетом, чтобы свиноматка не была истощена перед второй беременностью.

Поить кормящую матку нужно чистой водой комнатной температуры спустя час после еды.

Поросята до 4 недель находятся на материнском молоке. С 3—4-й недели их начинают подкармливать цельным и снятым коровьим молоком. На весь период подкормки нужно на поросенка до 10 литров цельного и 20 литров снятого молока. Молоко дается в отдельном корытце. Все, что в дальнейшем в течение получаса не будет съедено, выливается

Колхоз «Искра» (Барыбино, Моск. обл.). Поросята белой английской породы



вон, и корытце ставится на мороз. С этого же времени начинают давать цельные зерна овса и ячменя.

Когда поросята начинают сами поедать зерна, тогда им хорошо составить и засыпать в самокормушки следующие смеси: ячменя и кукурузы—50%, просеянного дробленого овса—30%, жмыха—10%, рыбной мясокостной муки—10%. При отсутствии последнего давать снятое молоко. Кроме того необходимо давать минеральные корма, состоящие из 40% мела или известки, 40% дробленой пережженной кости и 20% поваренной соли.

Подкормку поросят нужно делать в отдельном станке, как и кормление матери, чтобы поросята не поедали ее корм.

Поросята, начиная с двухнедельного возраста, осенью и зимой должны выпускаться с маткой на прогулку ежедневно при температуре не ниже 5° мороза в хорошую погоду. В 8-недельном возрасте поросята отлучаются от матки и выращиваются самостоятельно.

При осенних и зимних опоросах важно избегать падежа поросят. Все причины, влекущие за собой падеж, как указывалось выше, могут быть легко устранены путем внимательного, добросовестного отношения к супоросной кормящей свиноматке и поросятам со стороны обслуживающего персонала. Хороший уход за свиноматками и поросятами несомненно будет способствовать скорейшему разрешению мясной проблемы.

СТЕЦЮРА

ВЫРАЩИВАНИЕ ОСЕННИХ ПОРОСЯТ

(С. Э. Обел, свиновод с.х. колледжа в штате Канзас).

Выращивание осенних поросят у многих свиноводов требует больше труда и хлопот, чем выращивание весенних поросят.

Однако при надлежащем уходе и кормлении выращивание осенних поросят может быть очень выгодным. Это отчасти зависит от следующих двух обстоятельств. Во-первых, уходу за осенними поросятами можно уделять больше времени зимой, так как с.х. работы в зимний период значительно сокращаются, и, во-вторых, при двух пометах в год накладные расходы становятся менее чувствительными благодаря удвоенной эффективности маток. Тем не менее разводить осенних поросят ежегодно в количестве более половины весенних не рекомендуется.

Одной из причин мало успешного разведения осенних поросят у фермеров является то, что у них нет необходимого оборудования для надлежащего содержания поросят и ухода за ними. Поросята, появившиеся в более теплые весенние месяцы, в отношении помещения менее требовательны. Иное дело с осенними поросятами; они нуждаются в теплом, удобном помещении в течение целой зимы. Кроме того осенние поросята поздних осенних пометов не успевают иногда достаточно подрасти и окрепнуть до начала холодов. В результате получают хилые карлики. Пребывание внутри тесного помещения при отсутствии пастбища нередко вызывает среди поросят значительные потери от болезней и паразитов. Супоросные матки, проводящие лето на пастбище, обычно бывают в хорошем состоянии для осеннего опороса. Весьма важно, чтобы поросята появлялись в сентябре, что обеспечивает им надлежащее развитие и дает возможность отнимать их от матки до наступления холодов.

Если будут приняты вышеуказанные меры, поросята окажутся в благоприятных условиях для своего развития, и в дальнейшем их благополучие, по мнению некоторых свиноводов, будет зависеть от их маток. Но этого мало, так как именно теперь наступает время, когда необходимо непосредственное руководство свиновода. Прежде всего он должен стараться, чтобы поросята непрерывно прибавлялись в весе. Для этого необходимо, чтобы матка получала рацион, в котором содержалось бы достаточное количество белков и минеральных веществ, обусловливающих обильное выделение молока. Существует немало кормовых комбинаций. Комбинация, которую на практике пользуются наиболее часто, состоит из 50% кукурузы, 40% отрубей, 5% мясной муки и 5% льняного жмыха.

В это время года на пастбище бывает еще люцерна. Этот корм очень полезен для поросят, так как увеличивает молочность маток. Можно использовать и ржаное пастбище, но только при сухой погоде.



Старший свиновод-ударник т. Харченко, премированный за рационализаторскую работу (Херьковщина, ст. Рогана)