

ПОДСТИЛКА ДЛЯ СВИНЕЙ

Свиньи любят сухую и мягкую постель, особенно зимою. Подстилка оказывает большое влияние на здоровье свиней и на успешность выращивания поросят. Она предохраняет свиней от простудных заболеваний: от ревматизма, от маститов вымени у маток и т. д. Проводить опоросы в холодное и сырое время без сухой мягкой подстилки — это значит заранее обречь хозяйство на массовое заболевание и гибель поросят. Кроме того зимою в холодных свинарниках при обильной подстилке можно сэкономить не менее 10% корма, так как без нее будет требоваться излишний расход корма на согревание свиней. Все это обязывает хозяйство своевременно озаботиться о заготовке подстилки в достаточном количестве. Не все сорта подстилки одинаково хороши.

Пшеничная солома считается самой лучшей подстилкой. Ржаная также хороша, но несколько грубовата для маленьких поросят. Далее идут яровые сорта соломы: овсяная, ячменная, просьяная. Они достаточно мягки, но быстро истираются, образуя труху; кроме того они, особенно ячменная травянистая солома, а равно и сенная подстилка, способствуют развитию вшей и других кожных паразитов.

Торфяномоховая подстилка достаточно мягка и влагоемка, но она несколько пылит и грязнит. В северных районах этот сорт подстилки должен получить широкое применение для пополнения соломенной подстилки.

Древесные опилки и мелкая упаковочная стружка при наличии их могут служить хорошим подстилочным материалом, особенно при откорме свиней вблизи городов. Свиньи хорошо вытираются об опилки и принимают чистый, опрятный вид. Сухие опилки

хороши тем, что они в значительной степени очень влагоемки. Вместе с соломой опилки весьма пригодны для подстилки при перевозке свиней в вагонах, клетках, фургонах и т. д. Сухие опилки должны также употребляться для посыпки пола коридоров, проходов в свинарник и в тех местах стойл, где свиньи устраивают себе уборную. Опилки очень сушат полы и воздух в свинарнике.

Древесный лист, собранный в сухую осень с добавкой соломы может с успехом использоваться для подстилки, особенно при групповом содержании свиней для нижнего слоя. Лист кроме пополнения запаса подстилки дает прекрасное удобрение.

Способы употребления подстилки

Применяются два способа. Первый состоит в том, что ежедневно подстилка в большей своей части выбрасывается и заменяется свежей подстилкой. На каждую взрослую свинью идет около 2 кг подстилки, а для поросят и подвинков при групповом содержании около 1 кг в день на голову. Этот способ может применяться в благоустроенных, достаточно теплых свинарниках со скатом для мочи и с теплым настилом для спанья свиней. Расход подстилки при этом способе значителен.

При холодных или земляных полах в неотапленном свинарнике указанный способ применения подстилки плохо достигает цели, так как ежедневная порция подстилки мала и из нее нельзя создать достаточно толстого, сухого и мягкого матраца. Поэтому при групповом содержании поросят, подвинков и маток в холодных свинарниках следует применять второй способ. Он заключается в том, что свиньям сразу стелют в один конец стойла толстый



слой подстилки в 0,5 м толщиной и более. Это дает свинье возможность устроить себе теплое, сухое, мягкое логово и зарываться в солому. При этом свиньи очень аккуратно соблюдают чистоту своего логова, не загрязняют его навозом и мочой, а выбирают для этого один угол стойла, конечно, если стойло не забито свиньями так, что им негде повернуться.

Чистота стойла и логова и экономия подстилки еще лучше соблюдается, если свиньи имеют свободный выход из стойла на двор или в коридор свинарника.

При таком способе расход подстилки значительно меньше. Требуется лишь опрavlять логово и подсыпать сверху небольшое количество свежей подстилки, удаляя выбившуюся из логова и загрязнившуюся часть старой подстилки. Смена всей подстилки бывает необходима через очень длительный срок — один-два раза в зиму. Выброшенную из свинарника подстилку и навоз лучше всего отвозить сразу в поле или в навозохранилище, а не скапливать вокруг свинарника.

Осенью и в зимнее время для опоросившихся маток и маленьких поросят необходимо иметь постоянно возобновляемый запас сухой, согревшейся в свинарнике подстилки. Для этого подстилку заранее вносят в свинарник и рыхло наваливают ее в свободном стойле, чтобы она могла согреться и просохнуть до употребления. Подстилать сразу принесенную с холода несогревшуюся солому, часто запорошенную снегом или смоченную дождем очень вредно — этим вызываются губительные заболевания поросят. Поэтому необходимо без всяких от-

говорков пользоваться для маток с поросятами только согревшейся просохшей подстилкой.

Вообще хранить подстилку лучше под крышей, чтобы она не могла заноситься и перемешиваться со снегом и увлажняться дождем. Во всяком случае очередной запас подстилки, привезенной из стога, должен убираться под навес, при этом овершье стога, занесенное снегом или увлажненное дождем, не следует брать, а снова прикрывать им стог.

Выше отмечалось, что травянистая подстилка способствует размножению вшей. В холодные сезоны борьба с паразитами бывает очень затруднена, так как купанье и мытье поросят невозможны.

Между тем паразиты наносят большой вред поросятам и свиньям. У животных наблюдается зуд, плохое самочувствие, истощение. Борьба с паразитами может вестись таким способом. Заложенную в вычищенное стойло свежую подстилку слегка опрыскивают микстурой, приготовленной следующим образом: распускают 115 г обыкновенного стирального мыла в 45 л мягкой воды при кипячении; когда мыло распустится, в теплый еще раствор вливают 9 л керосина и сильно размешивают смесь.

Для употребления одну часть полученной мыльно-керосиновой эмульсии прибавляют к 8 или 10 частям горячей воды и этот раствор употребляют для опрыскивания подстилки. Свиньи, помещенные на опрысканную подстилку, самосмазываются керосиновой эмульсией и благодаря длительному действию смазки очищаются от паразитов.

Проф. С. Л. МУЗЬМИН

ТОЛЬКО В ЧИСТЫХ, СУХИХ И ТЕПЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МОЖНО ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВЫЙ МОЛОДНЯК



Совхоз № 22 (Северный Кавказ)

Внутренний вид строящегося свинарника для поросных маток