

В стадо слученных маток следует ежедневно для контроля впускать хряка. Все повторно пришедшие в охоту матки должны регистрироваться и получать условные отметки или насечками на ушах или выстригами на щетине.

После случки такие матки переводятся в группы одновременного с ними покрытия. В случае нового перегула отмененных маток должен ставиться вопрос или о ветеринарном вмешательстве или о выбраковке их для откорма.

Эта схема очень проста, хозяйственно удобна и при внимательном отношении дает самые благоприятные результаты в смысле снижения до минимума процента прохолостения.

Провести индивидуальный подбор, принимая во внимание современные масштабы промышленных свиноводческих ферм, невозможно. Но классовый подбор, на основе продуктивности маток и закрепления этой продуктивности в потомстве, необходим и обязателен.

Доцент М. Ф. ВСРОНИ

УХОД ЗА ХРЯКОМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

Первый год работы Свиноводтреста и Свиноводколхозцентра шел по линии собирания и накопления стада. Все внимание систем было обращено на количественное увеличение стада.

На второй год работы свиноводческие системы должны обратить серьезнейшее внимание на качественное улучшение стада.

Постановление коллегии НКЗема СССР от 29 сентября обязывает Свиноводтрест и Свиноводколхозцентр завершить сплошную метизацию свиного стада к 1935 г.

Важнейшей задачей в деле успешного разрешения животноводческой проблемы наряду с улучшением кормления, содержания и ухода за скотом, должно быть повышение скороспелости животных путем массовой метизации беспородных и низкокачественных живогных культурными и скороспелыми породами.

Недостаточность породных хряков-производителей обязывает нас к особенно бережному, наиболее рациональному использованию их.

Породный хряк-производитель в свиноводческом хозяйстве решает все. Недаром американские свиноводы говорят: «Хороший хряк половину стада стоит». Иметь хорошего хряка еще мало, нужно знать, как за ним ходить и как его правильно использовать.

Содержанию и уходу за хряком в большинстве совхозов и колхозов не придавали должного внимания, между тем половая деятельность хряка целиком зависит именно от ухода и содержания.

Предоставление хряку ежедневной (во все времена года) достаточной прогулки на чистом воздухе и содержание его в чистом сухом помещении — основные требования ухода.

Для того чтобы хряк находился на чистом воздухе, устраивают особые варки размером 25 × 12 м, где делают досчатый настил с подъемом от земли и легкий навес, для того чтобы хряк мог укрываться во время жары и непогоды.

В такой варке хряк находится с ранней весны до глубокой осени.

Хряка нужно держать в надлежащей чистоте. Зимой его необходимо мыть теплой водой не реже как через 2—3 недели. Летом предоставлять частые купания в реке или каком-либо другом водоеме; если этого нет, то просто делать обливание из лейки.

Не допускать, чтобы у хряка появились паразиты — они страшно изнуряют животное. При появлении паразитов нужно принять все меры к их уничтожению.

В обращении с хряком нельзя быть грубым. Криков и в особенности побоев ни в коем случае нельзя допускать. От криков хряк делается пугливым и во время случки наспех кроет маток; побои делают хряка злым и это усложняет уход за ним.

У взрослых хряков необходимо удалять клыки, чтобы он ими не поранил маток.

Особого ухода требуют ноги хряка. У некоторых сильно разрастаются копыта и затрудняют движение хряка. От недостатка движения хряк жиреет и неохотно идет в случку. По мере отрастания копыт их нужно подрезать.

В кормлении хряка необходимо быть осторожным: как перекормленный, так

и недокормленный хряк для случки не годится.

Лучшими кормами нужно считать: из концентрированных — овес, ячмень, просо, отруби и в небольшом количестве жмых; из сочных — свеклу, морковь, тыкву и др. В летнее время хряку необходимо широко предоставлять пастбище. Зеленый корм — клевер, люцерна, вика, соя и т. п. — лучший витаминный корм для хряка. Дачу вареного картофеля производить в умеренных количествах, так как картофель способствует ожирению.

В случной период обязательно давать в корм хряку овес — от 0,5 до 1 кг — или просяную муку — от 0,5 до 0,8 кг в день.

Ежедневная дача концентрированных кормов в случной период должна составлять не менее 3,5% живого веса хряка. В зимнее время в рацион помимо корнеплодов необходимо вводить хорошее клеверное или люцерновое сено. При отсутствии бобового сена нужно давать корма животного происхождения, богатые белками — снятое молоко, мясную муку и пр.; при зимнем кормлении желательнее ежедневно давать по 20 г мела.

Кормовой рацион хряка должен состоять из смеси зерновых кормов с достаточным количеством белка.

На 100 кг живого веса хряка необходимо дать 150 г белка.

Дача жмыха (в небольшом количестве), отрубей и корнеплодов предохранит от запоров.

После кормления корыто обязательно тщательно промыть и выставить на волю для проветривания и просушки.

Первый раз в случку хряк должен идти не моложе 11—12 месяцев. Хряки моложе этого возраста дают слабых порсят.

Молодым хрякам больше 25—30 маток давать не следует. В двух- и трехлетнем возрасте можно давать 55—60 маток. Лучший приплод хряк дает в 3—4-летнем возрасте.

Некоторые хозяйственники боятся крыть мелких маток крупными хряками, ссылаясь на то, что будут трудные роды. Боязнь эта совершенно несостоятельна. Именно спаривание матки с крупным хряком является одним из лучших и скорых способов поднятия продуктивности нашей беспородной свиньи. Для этого нужно иметь крепкую, здоровую свиному и обеспечить хорошее ее содержание.

При правильном содержании и использовании хряка он может служить производителем 5—6 лет.

Для оплодотворения матки вполне достаточно одной садки хряка; если почему-либо приходится производить две садки, то первую производят ране утром, а вторую — после полудня.

Случку лучше производить до кормления хряка, так как после кормления хряк обычно вял и стремится лечь.

Некоторые хряки неохотно кроют маток в присутствии посторонних людей; это пороком считать нельзя, но такую особенность нужно учитывать.

Нельзя станок хряка иметь рядом с матками, так как хряк волнуется и быстро худеет.

При групповом содержании хряков-производителей необходимо в случку пускать всю группу. Если этого не требуется, то хряку, который делал садку, необходимо прилущии и яички смазать слабым раствором креолина, так как запах матки остается у хряка и волнует остальных хряков; они прыгают друг на друга, кусают яйца и причиняют серьезные повреждения.

М. М. ГАВРИЛОВ

В области животноводства еще в большей мере, чем в зерновом хозяйстве, мы вынуждены быть новаторами, ибо образцов крупного животноводческого хозяйства, — такого, какое мы развешиваем, — в мире нет

(Яковлев, VI съезд советов)

Чтобы иметь хороших порсят, необходимо особенно заботливо относиться к маткам

Основной уход за поросятами заключается в том, чтобы обеспечить их соответствующими помещениями, чистым воздухом, хорошей подстилкой и правильным кормлением